

Clausen, P. & J. Madsen 1986: Forekomsten af Korttaet Træløber *Certhia brachyactyla* i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 9-16.

Frich, A. S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.

Gustad, J. R. 1992: Fugle i Norge 1991. – Vår fuglefauna. 15: 209-226.

Hansen, A. G. 1992: Sorthalset Lappedykker i amtet. – Strandskaden (DOF Ribe Amt) 1: 30.

Johannsen, W. 1991: Hjælp storken. En statusrapport. – Fugle 11(3): 14.

Jørgensen, H.E., J. Madsen & P. Clausen 1993: Rastende bestande af gæs i Danmark 1984-92. – Faglig rapport fra DMU. Kalo.

Jørgensen, H. E. 1989: Danmarks rovfugle. – Frederikshus.

Lyngs, P. 1992: Ynglefuglene på Græsholmen 1925-90. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 1-93.

Olsen, K. M. 1990: Flodsangeren *Locustella fluviatilis* i Danmark, med noter om feltbestemmelse. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 15-20.

Olsen, K. M. 1992: Danmarks Fugle – en oversigt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Tofft, J. 1993: Ynglende Turtelduer i Sønderjylland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 251.


Tyrberg, T. 1992: Fågelrapport för 1991. – Vår Fågelvärld 51(7-8): 33-63.

Antaget 2. februar 1993

Rapportgruppen,
Dansk Ornitologisk Forening,
Vesterbrogade 140,
1620 København V

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991

ALEX SAND FRICH og LARS NORDBJÆRG



Rapport nr 21 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 1991)

Indledning

I nærværende rapport er medtaget 189 færdigbehandlede sager fra Danmark og Grønland. Af disse blev 153 godkendt, mens 36 blev forkastet. Dette svarer til en godkendelsesprocent på 81.

Den systematiske gennemgang og regionale inddeling er som i tidligere rapporter. Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét "rastende" individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad.= adult (gammel udfarvet fugl), imm.= immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv.= juvenil (første fjerdragt efter pullusdragten), pull.= pullus (dununge), sdr.= sommerdragt, vdr.= vinterdragt, odr.= overgangsdragt, rst.= rastende, trk.= trækkende, trk.fors.= trækforsøg, syng.= syngende og ringm.= ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet tre tal: 1) antal fund før SUs oprettelse i 1965; 2) antal hidtil godkendte fund, bortset fra fund nævnt i denne rapport; 3) antal godkendte fund i denne rapport. Bemærk, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, da flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på en dag regnes som fem fund. Signaturerne efter observationerne er observatørens initialer.

Bagest i rapporten findes lister over observatører og forkastede fund, samt rettelser til SU-rapport nr 20 (Frich & Nordbjærg 1992).

Godkendte sager

Fra 1991 godkendtes Slagfalk og Nonnestenpikker som nye arter for landet. Ligeledes godkendtes fra 1989 det første fund af underarten *feldegg* af Gul Vipstjert. Andre yderst usædvanlige iagttagelser i 1991 var andet fund af hhv. Sortbrynet Albatros og Lille Rørsanger, første fund af Stribet Græshoppesanger siden 1943 og af Dværgrappe siden 1959, tredje fund af Gulbrystet Værbling, fjerde og femte fund af Sortstrubet Drossel (det ene dog fra 1986), femte fund af Ørnevåge, samt femte og sjette fund af Dværgeom.


SU-listen

På udvalgets fællesmøde i december 1992 blev det besluttet, at Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus*, Kongeederfugl *Somateria spectabilis* og Lundsanger *Phylloscopus trochiloides* ikke skal forelægges SU fra og med 1993.

Sidste offentliggjorte SU-liste stod i DOF-Nyt 1991 nr 3, side VIII. Til denne skal føjes Tyknæbbet Dværgryle, Sydlig Nattergal, Sort Trupial og Gulhovedet Trupial.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

SU består idag af følgende: David Boertmann, Erik Christophersen, John Faldborg, Alex Sand Frich, Peter Lyngs, Lars Nordbjærg, Ivan Olsen



Regionsinddelingen anvendt i denne artikel.
Geographical regions of Denmark used in this report.

(sekretær), Lars Paaby, Søren Sørensen og Ole Thorup. Erik Christophersen er sidst tilkomne medlem.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes David Boertmann, Alex Bühring, Rolf Christensen, Erik Christophersen, John Faldborg, Per Schiermacher Hansen, Ivan Olsen, Knud Pedersen, Lennart Pedersen, Søren Sørensen og Ole Thorup. Den største tak rettes dog til de mange, der gennem 1991 rapporterede deres observationer til SU, og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Sjældenhedsudvalgets adresse

SUs adresse er: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

Systematisk gennemgang af de godkendte sager

Accepted records

Islom *Gavia immer* (-,180,4)

1984: 9.5, Skagen Nordstrand (NJ), ad. i sdr. trk., JP.

1990: 14.4, Skagen Nordstrand (NJ), ad. i odr. trk., OGJ. – 25.4, Skagen Nordstrand (NJ), 2 ad. i sdr. trk., BBP.

Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii* (9,142,4)

1990: 14.4, Skagen Nordstrand (NJ), ad. i sdr.

trk., OGJ. – 25.4, Skagen Nordstrand (NJ), 2K og ad. i sdr. trk., BBP. – 28.4, Skagen Nordstrand (NJ), 2 ad. i sdr. trk., BBP.

Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Sortbrynet Albatros *Diomedea melanophrys* (0,1,1)

1991: 23.9, Ørhage, Klitmøller (NJ), ad., HHB, RoC,EC,SK.

Første fund var 19.7 1990 (Frich & Nordbjærg 1992).

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* (0,18,1)

1991: 1.10, Blåvand (VJ), trk., FF,MC,HK.

Man kan undre sig over, at der ikke er flere fund fra Danmark, da Sverige har 21 til og med 1991. Fra Norge foreligger der imidlertid blot 4 fund (Elmberg 1991).

Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus*

Med karakterer svarende til Middelhavsskråpe ssp. *mauretanicus* (1,8-9,2):

1991: 23.5, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., JB,JHC. – 12.8, Grenen, Skagen (NJ), trk., PAFR. Fundet fra Roshage er det første forårsfund. De resterende danske fund ligger alle i perioden juli-sep., i forbindelse med borttrækket fra ynglepladserne i Middelhavet, hvorunder en del fugle bevæger sig mod nord til den Engelske Kanal (Cramp & Simmons 1977).

Fra Sverige foreligger der 6 fund fra aug.-okt.(Elmberg 1992).

Middelhavsskråperne (sspp. *mauretanicus* og *yelkouan*) bliver undertiden opfattet som en særskilt art (*P. yelkouan*) i stedet for en underart af Alm. Skråpe, og dette ser ud til at blive almindelig praksis i britisk litteratur fremover (jvf. Chandler et al. 1993).

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis*

(-,14 f.o.m. 1984,2)

1991: 23.8, Roshage, Hanstholm (NJ), 2K trk., RoC,SK. – 27.10, Roshage, Hanstholm (NJ)*ad., PK.

Til trods for at Topskarv yngler talrigt i Norge, er den tidligere regnet som meget sjælden i både Danmark og Sverige. I 1990 (4 fund i Danmark) var der blot 3 fund i Sverige, hvilket ikke desto mindre var det højeste antal siden 1986 (Elmberg 1991). I 1991 fandt man imidlertid hvad der måske vil vise sig at være en overvintringslokalitet på den svenske vestkyst på øen Segelskärn i Bohuslän. Den 10. nov. sås ikke mindre end 38 ad. og 8 1K Topskarver her. Det bragte den svenske vinter- og efterårstotal op på 74 individer, hvilket "står fullkomligt i særklass" (Elmberg 1992).

[Flamingo *Phoenicopterus ruber*]

Med karakterer svarende til Europæisk Flamingo ssp. *roseus*:

1991: 7.10, Sydvestpynten, Amager (S), trk., PB. – 7.10, Hellebæk (S), trk., BR,RT,RB.

Fundene drejer sig om ét og samme individ. Forekomsten af Flamingoer i Danmark til og med 1989 er diskuteret af Christensen (1992). Konklusionen var, at et enkelt fund af *P. r. roseus* (fra 1933) muligvis kan regnes som spontant, mens alle øvrige må anses for undslupne fangenskabsfugle. Feltbestemmelse af Flamingoer er senest behandlet af Christensen (1991).

[Lille Flamingo *Phoenicopterus minor*]

1991: 17.1, Nivå (S), ad., via RoC.

lagttagelser af Flamingoer skal ikke forelægges SU, men indsendes til lokalrapportgrupperne. En opfordring i Skov et al.(1992) om at bestemme Flamingoer til art og underart bør følges, og vil være en betingelse for at få et korrekt billede af Flamingoernes optræden i Danmark.

Sædgås *Anser fabalis*

Med karakterer svarende til Tundrasædgås ssp. *rossicus* (1,20,4):

1985: 16. og 18.2, Filsø og Rølsø (VJ), mindst 25 eks., OT.

1991: 5.2, Gunderslevholm (S), 5 eks., BT. – 3.2, Ballum enge (SJ), PM. – 5.5, Harboør Tange (VJ), OA.

De i alt 25 fund omfatter 80 eks. Siden 1985 har racen været årlig bortset fra 1987. Det skyldes næppe en reel stigning i antallet af overvintrende fugle, men er snarere resultatet af en øget viden om racen blandt feltornitolo-

ger. Tundrasædgåsens optræden i Danmark er behandlet af Olsen (1990b); en mere udførlig diskussion af racens systematik samt dens optræden i Holland gives af Burgers et al. (1991).

Racen er fra og med 1993 udgået af SU-listen.

Blisgås *Anser albifrons*

Med karakterer svarende til Grønlandsk Blisgås ssp. *flavirostris* (0,19,6):

1986: 2.4, Værnengene (VJ), 2 ad., OT.

1990: 24.10, Thorup Fjordholmene, Limfjorden (NJ), 4 ad., HHB.


1991: 20.1, Thorup Fjordholmene, Limfjorden (NJ), 4 ad. og 2 2K, HHB. – 22.3-20.4, Bøvling Klit (VJ), 2K, OGJ,OA,EE,KH,LP m.fl. – 24.3 Bøvling Klit (VJ), ad., OA. – 25.10, Bøvling Klit (VJ), ad., EE.

Fundet fra 1986 kan muligvis dreje sig om samme fugle som det godkendte fund fra Bøvling Klit 13.5 1986 (Olsen 1988).

Dværggås *Anser erythropus* (29,33,2)

1986: 3.-17.3, Fjordholmene, Limfjorden (NJ), ad., PAFR m.fl.

1991: 20.10, Højstrup Strand, Helsingør (S), 1K trk., RT,BR. – 20.10, Espegårde (S), 1K trk., JL. De to fund fra 1991 vedrører samme individ.



Siden 1972 har en Sortbrynet Albatros holdt til i Sulekolonien på Hermaness (Shetland). Det er muligvis denne fugl, der nu et par gange er set i danske farvande. Foto: K. Larsen.

Rødhalset Gås *Branta ruficollis* (8,12,1)

1989: 15.10, Bøtø Nor (LFM), ad., BR,HHS, SS,KW.

1991: 24.-26.3. 28.-29.3 samt 13.4 Bøvling Klit (VJ), ad., OGI,OA,EE,LP,JEE m.fl. – 5.-7.5, Harboør Tange (VJ), ad., OA,EE,JoL. – 10.-19.10, Filso (VJ), ad., EO,JF,MFJ,MJ.

Fundet fra 1989 er tidligere godkendt. Forårsfundene fra Bøvling Klit og Harboør Tange samt efterårsfundet fra Filso regnes som samme individ. Årsagen er, at det sandsynligvis drejer sig om en fugl, som oversommer sammen med ynglende Kortnæbbede Gæs *Anser brachyrhynchus* på Svalbard (R. Christensen i brev) og følger dem også i vinterkvarteret.

Kongeederfugl *Somateria spectabilis* (20,60,8)

1990: 30.12, Hundested Havn (S), ad. han, SD,LR,HR.

1991: 5.1, Gilleleje (S), 2K han trk., BR. – 17.2, Hundested Havn (S), ad. han trk., SHN. – 8.3, et kvarters sejlads fra Hundested (S) med Hundested/Grenå færgen, ad. han, ES,JMP,JL. – 16.3, Issehoved, Samsø (OJ), ad. han, SD. – 18.3, Christiansø (B), ad. hun, JB,KC,ML,MD. – 31.3, Langdalen, Samsø (OJ), ad. han trk., SD. – 24.12, Stengehus v/Asserbo (S), ad. han, HHN,SHN.

Fuglene ved Hundested, som alle var adulte hanner, er opregnet som særskilte fund, selv om det eventuelt drejede sig om samme individ. Der rastede et meget stort antal Ederfugle i området i den pågældende periode (Lennart Pedersen pers. medd.), og det er sandsynligt, at der var flere Kongeederfugle til stede.

Siden 1982 har arten været årlig med et største antal på 11 eks. i 1989. De fleste fund er gjort i de indre danske farvande, altså i traditionelle overvintringsområder for Ederfugl.

I Sverige er antallet af fund steget næsten uafbrudt siden begyndelsen af 80'erne, med et foreløbigt maximum på 159 i 1990 og mindst 150 i 1991 (Tyrberg 1992).

Arten er fra og med 1993 udgået af SU-listen.

Brilleand *Melanitta perspicillata* (0,7,1)

1991: 22.10, Skagen Nordstrand (NJ), ad. han trk., KP.
6 af de 8 fund er gjort i okt./nov.

Slangeørn *Circus gallicus* (1,10,2)

1991: 11.5, Gjerrild Nederskov ved Veggerslev (OJ), HC. – 29.8, Højerup, Stevns Klint (S), trk., KW,LeP,JHC.

Første år med mere end et fund. Fuglen ved Højerup er sandsynligvis identisk med en, der sås trække ud ved Falsterbo samme dag (Elmberg 1992). Den geografiske fordeling af de danske fund ser således ud: Nordjylland 4, Østjylland 2, Sønderjylland 1, Sjælland 4, Møn 1 og Bornholm 1. Arten ses oftest i Nordjylland om foråret og på Sjælland om efteråret.

Steppehøge *Circus macrurus* (15,33,2)

1991: 4.5, Kysing Fjord (ØJ), 2K trk., OGI. – 25.9, Sydvestpynten, Amager (S), 1K trk., PB, FHJ.

Ørnevåge *Buteo rufinus* (1,3,1)

1991: 18.5, Skagen v/det Grå Fyr (NJ), sandsynligvis 2K trk., ASF,AB,MH,LP,RT m.fl.
Seneste fund var 1.5 1986 ved Køge (Olsen 1988). I 1991 blev der konstateret et mindre influx i det østlige Østreg med 7 fund af mindst 3 forskellige individer (Berg 1992). I Sverige er der foreløbig godkendt et fund fra efteråret 1991 (Elmberg 1992).

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (9,38-40,3)

1990: 6.5, Hellebæk (S), imm. trk., SS,TS,GØ.

1991: 29.8, Højerup, Stevns Klint (S), ad. trk., JS,JL,KW,LeP,JHC. – 14.9 Stigsnes (S), ad. trk.-fors. og 16.9 trk., CEP,AH,UDA.

Fundene fra 14. og 16.9 regnes som samme individ.

Kejserørn *Aquila heliaca* (0,18,0)

1979: 12.7, Christiansø (B), imm. trk., SP.

Iflg. dragtdetaljer identisk med den tidligere godkendte fra Allinge (B) 13.7 1979 (Olsen 1989).


Dværgørn *Hieraaetus pennatus* (0,4,2)

1991: 29.4-2.5, Flagbakken, Skagen (NJ), mørk fase, trak den 2.5, EHS,EC,RoC. – 29.8, Højerup, Stevns Klint (S), mørk fase, trk., KW,LeP,JHC.
Første fund af mørk fase i Danmark. Begge fugle havde slidt fjerdragt, og det er ikke utænkeligt, at det faktisk var samme individ der sås ved begge tilfælde. Fuglen fra Stevns var med sikkerhed identisk med et eksemplar, der blev jagtaget over Falsterbo i dagene forinden (Elmberg 1992).

Slagfalk *Falco cherrug* (0,0,1)

1991: 7.5, Flagbakken, Skagen (NJ), trk., EC, RoC,KT m.fl.

Ny art for landet. Arten er yderst sjælden som ynglefugl i det østlige Europa, hvor bestanden skønnes til ca 150 par. I de nordligste områder (Slovakiet og Ungarn) menes en del af fuglene at trække bort om vinteren, hovedsageligt til Middelhavslændene (Alström et al. 1991). Slagfalken holdes imidlertid hyppigt i fangenskab hos falkonerer, og rømning kan absolut ikke udelukkes. Der blev dog ikke set læderstropper eller lignende på Skagen-fuglen, og fundet betragtes derfor som "spontan" i lighed med iagttagelser af Steppeørn *Aquila nipalensis*, hvor der ikke entydigt konstateres tegn på tidligere fangenskab. Arten er tidligere observeret ved Skagen den 18.5 1985, men her var der med sikkerhed tale om en undsluppet fangenskabsfugl (Olsen 1987).



Den mørke Dværgørn på Skagen 29.4.-2.5. 1991. Foto: Erik Christophersen.

Dværgtrappe *Tetrax tetrax* (21,0,1)

1991: 27.7-24.8, Fællesfolden nord for Reersø (S), 2K han, VF,JH,BP,AP,JMP,CH.

Seneste fund er fra 1959, og alle øvrige ligger før 1923 (S. Sørensen i brev). Ifølge Dybbro (1978) er der 21 danske fund, hvoraf 3 dog er noget usikre. De fleste er fra perioden nov./dec. og menes at stamme fra de Centralasiatiske bestande, der overvejende er trækfugle med hovedtræktid i okt. (Olsen 1992). Fuglen ved Reersø er første fund fra juli/aug., og det kunne måske tyde på en oprindelse i Sydvesteuropa.

Triel *Burhinus oedienemus* (21,9,1)

1991: 24.4, Grenen, Skagen (NJ), trk., EC,EHS.

Rødvinget Braksvale *Glareola pratincola* (2,6,1)

1990: 10.7, Stranden ved Busenmarke Mose, Møn (LFM), trk., NPA m.fl.

Første fund siden 1987. Total på 9 fund kan sammenlignes med blot 4 fund af Sortvinget Braksvale *Glareola nordmanni*.

Tundrahøjle *Pluvialis dominica/fulva* (0,5,1)

1991: 19.8, Bygholmengen, Vejlerne (NJ), ad. i str., TeS,JFA.

Fundet kunne ikke godkendes til art, men der var dog flere karakterer, som tydede på Amerikansk Tundrahøjle *P. dominica*. Denne er endnu ikke med sikkerhed truffet i Danmark, mens der er 2 fund af Sibirisk Tundrahøjle *P.*

fulva. Problematikken omkring feltbestemmelse af *dominica/fulva* er behandlet af Alström et al. (1991). I den angivne total indgår både bestemte og ubestemte fund.

Damklire *Tringa stagnatilis* (0,19,1)

1991: 5.6, Hovvig, Rørvig (S), LaB.

Til sammenligning var der i 1991 12 fund i Sverige (Elmberg 1992).

Lille Kjøve *Stercorarius longicaudus*

1988: 10.10, Thorsø, Grenå (ØJ), ad., MEN.

I 1988 sås et meget stort antal Lille Kjøve; overvejende adulte fugle (Christensen et al. 1990). – Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Storkjøve *Stercorarius skua*

1989: 12.2, Bygholmengen, Vejlerne (NJ), JFA, OL via TeS.

Sjælden vinter- og forårsgæst. I perioden 1970-90 var der 37-38 vinter- og forårsfund i Danmark, heraf 13-14 i 1990 (Skov et al. 1992). – At dette fund samtidig er fra indlandet gør det specielt usædvanligt.

Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus* (6,ca 165,2)

1985: 27.5, Nyord, Møn (LFM), 2 ad., BR,JeF, RT.

1988: 5.10, Korshage, Rørvig (S), 2K trk., LaB.
Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus* (3,33,2)

1990: 19.8, Gedser (LFM), 1K, IA.

1991: 8.9, Langli (VJ), ad. i næsten fuld sdr. trk., OT,TT,FH.

Identifikation af *Chlidonias*-terner i juvenil dragt og vinterdragt kan være vanskelig. Bestemmelsesproblematikken er udførligt behandlet i Alström (1989) og mere populært i Alström (1991).

Polarlomvie *Uria lomvia* (5,2,1)

1991: 14.1, mellem Hanstholm og Kristianssand (NJ), JaD.

Blot den anden feltobservation herhjemme – den første var i Hundested Havn 10.12.1989 (Olsen 1991). Nærmeste ynglepladser er Island og Nordnorge. Optræder meget fåtalligt i Nordsøen og ses derfor yderst sjældent ved Nordvesteuropas kyster. På de Britiske Øer foreligger der blot 27 fund til og med 1991 (Rogers et al. 1992).

Lunde *Fratercula arctica*

1990: 12.3, Gilleleje (S), 2K trk., BR,AB,MH. – 15.9, Gilleleje (S), 1K trk., BR,RT.
Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Stor Hornugle *Bubo bubo*

1984: 8.4, Tønder (SJ), ad., via RoC.

1985: 28.5, sydlige Jylland, 3 pull. ringmærket, heraf 1 fundet død 2.8, via RoC.

1990: 5.6, sydlige Jylland, ad., RoC.

1991: 23.5, sydlige Jylland, 1 ad. og 3 pull., RoC.

Fundet fra 1985 er den første dokumenterede yngleforekomst i dette århundrede (Olsen 1991). Iagttagelser fra Sønderjylland efter 1992 behandles ikke af SU; alle fund skønnes at stamme fra udsatte fugle i Tyskland.

Høgeugle *Surnia ulula*

(ca 30,24 udover invasionen i 1983/84,3)

1990: 17.-18.2, Stenbjerg Klitplantage (NJ), JKK. – 25.4, Skagen (NJ), JP,MLu. – 22.11-31.12, Ryget Skov, Værløse (S) ad., RoC.

1991: 1.1-22.3, Ryget Skov, Værløse (S) ad., RoC.

Fuglen fra Værløse 1990/91 er formentlig identisk med det individ, som opholdt sig i området 1989/90 (Frich & Nordbjærg 1992).

Perleugle *Aegolius funereus*

1979 og 1980: ynglefund på Bornholm (B), via SK.

Første dokumenterede ynglefund. Olsen (1992) angiver, at Perleuglen yngler med 1-5 par årligt på Bornholm. – Arten behandles normalt ikke af SU.

Alpesejler *Apus melba* (3,14,2)

1991: 8.7, Ulvshale Strand, Møn (LFM), NPA, PtL. – 17.7, Møns Klint, Møn (LFM), 2 eks., LB.
Fundet fra 17.7 er det første, der omfatter mere end ét eksemplar.

Rødrygget Svale *Hirundo daurica* (2,23,2)

1991: 10.5, Gilleleje (S), rst. senere trk., PEP, BR m.fl. – 27.-28.6, Skagen (NJ), KP,KEC,LeP.

Storpipber *Anthus richardi* (2,139-140,14)

1965: 9.-11.9, Christiansø (B), HsM,EJ.

1980: 13.5, Gilleleje (S), trk., TA m.fl. – 2.9, Christiansø (B), PL,JF.

1981: 30.11, Fanø (VJ), KF. – 4.12, Harboør Tange (VJ), MHa.

1982: 8.10, Blåvand (VJ), KN. – 28.10, Ellekrattet, Skagen (NJ), trk., BB,KP.

1984: 28.9, Ishøj Strand (S), TWJ.

1985: 3.2, Bøjden Nor (F), EEh, HÆ. – 14.9, Spodsbjerg, Hundested (S), MT.

1987: 2.10, Blåvand (VJ), trk., HM. – 15.10, Frederiksberg, København (S), trk., KN.

1990: 17.10, Blåvand (VJ), trk., MC,FF,HK. – 23.10, Blåvand (VJ), trk., MC.

Alle tidligere forkastede fund er blevet genbehandlet efter nye kriterier, hvorefter ovennævnte har kunnet godkendes. Mest usædvanlige, men dog ikke enestående, er iagttagelserne fra februar og maj.

Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Med karakterer svarende til Sorthovedet Gul Vipstjert ssp. *feldegg* (0,0,1):

1989: 9.-11.6, Arup Vejle (NJ), han, JFA,TeS.

Ny race for landet. Racebestemmelse af Sorthovedet Gul Vipstjert kræver særdeles gode iagttagelsesbetingelser, da risiko for forveksling med mørkhovede individer af Nordlig Gul Vipstjert ssp. *thunbergi* foreligger.

Alpejernspurv *Prunella collaris* (1,7,1)

1991: 9.5, Totten, Anholt (ØJ), CO,AJ.


Et typisk fund. Alle danske forekomster og 9 ud af 10 svenske er fra perioden apr.-juni (Breife et al. 1990).

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Med karakterer svarende til Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl ssp. *maura/stejnegeri* (1,17,2):

1991: 29.5, Blåvand (VJ), hun ringm., HHN m.fl. – 5.-7.10, Blåvand (VJ), han 1K (ringm. 5.10), MFJ,JS,JF.

Første fund siden 1988. Den tidsmæssige fordeling af de danske fund ser således ud: apr. 1, maj 4, sep. 5, okt. 8, nov. 1 og dec. 1. Majoriteten er således fra efteråret. De fleste Vestlig Sortstrubet Bynkefugl ssp. *rubicola* registreres derimod i marts/apr. (Olsen 1992). Problematik-



Sortstrubet Drossel ♂, Frederiksværk, 12. december 1991. Fuglen opholdt sig i et villakvarter, hvor den sås i selskab med Solsort og Vindrossel. En fældningsgrænse på de store armdækljer viste, at det var en 1K. Foto: Søren Haaning Nielsen.

ken omkring feltbestemmelse af østlige former af Sortstrubet Bynkefugl er bl.a. behandlet af Barthel (1992).

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* (0,0,2)

1991: 13.6, Det Grå Fyr, Skagen (NJ), han 2K, KP,EC. – 27.10-1.11, Christiansø (B), ad. han (ringm. 27.10), PeK,KC,ML,MH m.fl.

Ny art for landet. Arten observeres stadigt hyppigere i Nordvesteuropa, næsten udelukkende om efteråret. Som en parallel til de danske fund sås det hidtil største antal i Storbritannien i 1991 (5 fund), bl.a. den blot anden forekomst uden for efteråret (Østengland 20.6, Rogers et al. 1992). Fra Sverige foreligger der 8 fund, alle fra efteråret og senest 11.-12.10 1991 på Gotland (Elmberg 1992).

Sortstrubet/Rødstrubet Drossel

Turdus ruficollis

Med karakterer svarende til Sortstrubet Drossel ssp. *atrogularis* (2,1,2):

1986: 7.12, Jonstrup nær Ballerup (S), 1K hun, KT,MiT.

1991: 11.-15.12, Frederiksværk (S), 1K han, JeF,SHN.

Fundet fra 1986 er tidligere forkastet (Olsen 1988), men er nu genbehandlet og godkendt på baggrund af ny viden.

I Europa er racen *atrogularis* truffet ca 170 gange, mens *ruficollis* blot er registreret ca 23 gange. Hovedparten er fra okt.-maj (Alström et al. 1991). Bortset fra et fund fra Herlufmagle 1822 er de danske fund fra nov./dec.

Stribet Græshoppesanger *Locustella lanceolata* (3,0,1)

1991: 7.10, Blåvand (VJ), 1K fyrfald Blåvand Fyr, PK,JF,MFJ.

Også de tidligere danske fund vedrører fyrfaldne individer fra pri. okt. (Olsen 1992). Arten optræder næsten hvert efterår på Fair Isle, men meget sjældent andre steder i Storbritannien. Identifikation og optræden i Storbritannien er senest behandlet af Riddiford & Harvey (1992).

Flodsanger *Locustella fluviatilis* (3,85,2)

1987: 28.5, Busene Have, Møn (LFM), syng., LL,NA. – 4.6, Porsemosen (S), syng., LaB.

Artens forekomst i Danmark er behandlet af Olsen (1990a). – Fund efter 1988 skal ikke forelægges SU.

Lille Rørsanger *Acrocephalus agricola* (0,1,1)
1991: 9.6, Ellekrattet, Skagen (NJ), ringm., LBJ, EC.

Blot andet danske fund. Det første gjordes 5.9 1987 på Christiansø. Til sammenligning er arten registreret 13 gange i Finland (Jännes et al. 1991) og 12 gange i Sverige, hvor den har været årlig siden 1987 (Elmberg 1992). Elmberg (l.c.) nævner et ynglefund nær Åbo i Finland i 1991.

Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum*
(0,14,1)

1991: 3.-18.6, Christiansø (B), ringm. 3.6, AB, PL m.fl.

Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* (0,17,2)

1990: 5.5, Ellekrattet, Skagen (NJ), han, JP, AB, JD, BB, PAFR, HRC.

1991: 25.5, Grenen, Skagen (NJ), han, SD.
13 af 19 danske fund er fra maj.

Lundsanger *Phylloscopus trochiloides*
(2,211-212,12)

1991: 26.5, Korshage, Rørvig (S), EVR. – 4.6, Magleby Skov, Stevns (S), SAL. – 6.6, Vestvolden, Avedøre (S), JEE. – 6.-10.6, Christiansø (B), mindst 4 (heraf 3 ringm. 7.6), KC, ML, MD, HK. – 31.7-9.8, Christiansø (B), 4 (heraf 3 ringm.), PeK, KC, ML. – 15.8, Hanstholm (NJ), syng., RoC, SK. Arten har nu været årlig herhjemme siden 1970. Bedste år var 1988 med 53 eks. Langt de fleste fund er gjort på Møn, Christiansø og Bornholm. Især år med varme sydøstenvinde i slutningen af maj og begyndelsen af juni bringer mange fugle til landet. Langt hovedparten af fundene ligger i perioden ult. maj til med. juni, og kun et mindre antal (ca 30) er fra aug./sep. – næsten alle fra Christiansø (Olsen 1992).

Om efteråret kan arten let forveksles med østlige former af Gransanger *Phylloscopus collybita*, der ofte viser et svagt vingebånd. Øjenbrynsstriben, vingebåndets farve og udbredelse, samt fjerdragstens grundfarve og kaldet er de afgørende kendetegn: se bl.a. Alström et al. (1991). Arten er fra og med 1993 udgået af SU-listen.

Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus*
(3,215-217,1)

1990: 27.9, Hanstholm (NJ), ringm., JKK.
Fund af nominatformen ssp. *inornatus* efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Schwarz Løvsanger *Phylloscopus schwarzi*
(0,7,1)

1991: 6.10, Hanstholm (NJ), 1K ringm., JKK, RoC, SK.
Første fund siden 1987. Af de 8 danske fund er 6 fra Christiansø og 1 fra Sjælland. Alle ligger i perioden 21.9 til 19.10, og arten optræder således næsten en måned tidligere end Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus*. I 1991

var der 3 fund i Sverige og 16 i Storbritannien (Elmberg 1992, Rogers et al. 1992).

Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus* (0,14,11)
1990: 22.10, Kroghage, Gedser (LFM), MBG.

1991: 10.-29.10, Christiansø (B), mindst 8 fordelt på 10.10 1K ringm., 14.10 3, 14.-15.10 1K (ringm. 15.10), 15.10 1, 21.10 1-2 (heraf 1 1K ringm.), 29.10 1K ringm., PeK, KC, ML m.fl. – 11.-12.10 (ringm. 12.10), Gilleleje (S), PEP, PJP m.fl. – 21.10, Blåvand (VJ), 1K ringm., MFJ, BJ, JFE, O. Første danske fund i 1980 blev efterfulgt af 12 i 1987 og 2 i 1990. Forekomsterne i 1987 og 1990 stemmer fint overens med store forekomster i Storbritannien, 17 i 1987 og 18 i 1990 (Rogers et al. 1988, 1989, 1991). I Sverige var der 7 i 1987, men blot 1 i 1990 (Hirschfeld 1988, Elmberg 1991). I 1991 var der ét fund i Sverige, og foreløbig blot 3 godkendte fund i Storbritannien, mod altså 10 i Danmark (Elmberg 1992, Rogers et al. 1992).

Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* (0,8,2)

1990: 25.8, Christiansø (B), 1K ringm., MFJ, CaH, ML.

1991: 17.-18.10, Christiansø (B), 1K (ringm. 17.10), PeK, KC, ML.

Begge fugle havde karakterer som nominatformen ssp. *bonelli*. Oktoberfundet er det seneste i Danmark.

Lille Fluesnapper *Ficedula parva*

1988: 7.7, Marselisborg Skov (ØJ), ad. og 2 pull., TM.

Ynglefund er usædvanlige og behandles af SU.

Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis*
(18,82,15)

1990: 5.5, Christiansø (B), han, MFJ, ML, KC. – 10.5, Christiansø (B), ad. hun ringm., MFJ, ML, KC. – 11.5, Christiansø (B), 2K han ringm., MFJ, ML, KC. – 24.5, Christiansø (B), 2K han ringm., MFJ, ML, KC.

1991: 4.5, Gilleleje (S), han, JC m.fl. – 4.-15.5, Christiansø (B), mindst 8 hanner og 2 hunner fordelt på: 4.5 3K+ han ringm., 5.5 2 ad. han og 1 2K hun aflæst med svensk ring., 6.5 2 ad. han (heraf 1 3K+ ringm.) og 1 hun, 7.5 2 ad. han, 10.5 3 ad. han (heraf 1 2K og 1 3K ringm.), 11.5 2K han ringm., 14.-15.5 ad. han, ML, KC, MD.
Et rigtig godt år, der med 11 fund tangerer rekordåret 1987 (Olsen 1988).

Fyrremejse *Parus montanus*

1991: 6.4, Korshage, Rørvig (S), LaB.

Fuglen havde karakterer svarende til ssp. *borealis* fra Fennoskandinavien/Nordøsteuropa.

Kun fund uden for yngleområderne i Sønderjylland bør forelægges SU efter 1990.



Rødhovedet Tornskade, ad. ♂, Skagen, 8. juni 1991. Foto: Knud Pedersen.

Korttået Træløber *Certhia brachydactyla*

1990: 22. og 24.5, Korshage, Rørvig (S), PEL, KES, EVR.

Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Rødhovedet Tornskade *Lanius senator* (5,20,2)

1962: ukendt dato, Fornæs (ØJ), fundet udstopet på Østerskole i Grenå, via CO.

1991: 8.6, Grenen, Skagen (NJ), ad. han, KP, PT.

Rosenstær *Sturnus roseus* (20,21,1)

1991: 3.-21.8, Ræhr (NJ), ad., OGJ, OA, SJ, PK, JKK.

Fuglen var i dårlig kondition og blev fundet død 21.8 (E. Christophersen i brev).

Krognæb *Pinicola enucleator* (-,9,2)

1991: 5.3, Gilleleje (S), han rst. senere trk., JC. – 12.10, Solrød Strand (S), hunfarvet rst. senere trk., SAL.

Pileværling *Emberiza rustica* (0,19,3)

1991: 5.-6.5, Christiansø (B), hun, KC, JBa, ML, MD, HK. – 3.6, Christiansø (B), hun, PL. – 4.-5.6, Søndervig (VJ), han, EE, CHj, EØ, JBg.

Dværgværling *Emberiza pusilla* (0,28,6)

1991: 9.5, Christiansø (B), KC. – 21.9, Hanst-

holm (NJ), 1K ringm., RoC, SK. – 26.9, Christiansø (B), ML, KC, PeK. – 6.10, Vejlbj Klit, Harboør (VJ), KH, JTM. – 8.-28.10, Christiansø (B), 1K (ringm. 8.10), PeK, KC, ML. – 21.10, Christiansø (B), KC, LPo.

Med 6 fund bliver 1991 næstbedste år, kun overgået af 1988 med 8 fund (Olsen 1992).

Gulbrystet Værling *Emberiza aureola* (0,2,1)

1991: 30.8, Christiansø (B), 1K ringm., PeK, KC, ML.

De 2 tidligere fund er ligeledes fra Christiansø. Nærmest yngler en mindre bestand i Finland, mens hovedudbredelsen går gennem hele Asien til Japan. I Nordvesteuropa ses arten langt overvejende i første halvdel af efteråret. Flest er registreret på de Britiske Øer med 155 fund (Rogers et al. 1992). Arten holdes imidlertid også som burfugl herhjemme. En undersøgelse af 36 Nordøstjællandske dyrehandlere den 6. januar 1993 viste, at mindst én handlede med Gulbrystet Værling. Her fandtes 15-20 individer – alle i dårlig stand! (J. Fromsejer i brev).

Grønland

Stribet Ryle *Calidris melanotos*

1990: 9.6, Danmarkshavn, JG.

Det andet fund fra Danmarkshavn, og det fjerde fra Nordøstgrønland siden 1979. Fra Vestgrønland kendes 14 fund (D. Boertmann i brev).

Forældede sager

Records not accepted

Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii* 1990: 20.5, Skagen (NJ).
Middelhavsskråpe *Puffinus puffinus mauretanicus* 1991: 19.9, Lild Strand (NJ), trk.
Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* 1991: 10.5, Skagen (NJ), 5 trk. 23.9, Korshage, Rørvig (S), trk. 19.10, Ros-hage, Hanstholm (NJ), trk.
Purpurhejre *Ardea purpurea* 1991: 7.1, Brabrand Sø (OJ). 1.6, Kvols Vig (NJ).
Tundrasædgas *Anser fabalis rossicus* 1991: 4.4, Setso (S).
Kongeederfugl *Somateria spectabilis* 1991: 6.10, Klit-møller (NJ), trk.
Steppehøg *Circus macrourus* 1991: 6.7, Værmengene (VJ), 2K han.
Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 1991: 26.5, Gudhjem (B). 28.7, Bjørnø ved Fåborg (F).
Stor Skrigeørn *Aquila clanga* 1990: 31.3, Søborg (S).
Dvergørn *Hieraaetus pennatus* 1991: 19.5, Skagen (NJ).
Lille Tårnfalk *Falco naumanni* 1990: 28.7, Dybesø, Rørvig (S). han. – 1991: 10.5, Bødkermosen, Mon (LFM), han.
Jagtfulk *Falco rusticolus* 1991: 26.3, Plet enge, Harboør (VJ).
Plettet Rorvagtél *Porzana porzana* 1991: 5.2, Tipperne (VJ).
Strandskade *Haematopus ostralegus osculans* 1991: 24.3, Ølsemagle Revle (S).
Damklire *Tringa stagnatilis* 1991: 4.5, Noret, Tåsinge (F). 7.9, Frederiksværk (S).
Gulbenet Klire *Tringa flavipes* 1991: 29.7, Horsens (OJ). 10.8, Saltvandssøen (S). 28.9, Agger Tange (NJ).
Stor Sorthovedet Måge *Larus ichthyæus* 1987: 25.12, Skagen Nordstrand (NJ).
Steppehone *Syrhaptes paradoxus* 1991: 15.10, Hessel Hede (OJ).
Mellemflagspætte *Dendrocopos medius* 1990: 17.10, Blåvand (VJ).
Storper *Anthus richardi* 1990: 18.10, Blåvand (VJ).
Gul Vipstjert *Motacilla flava feldegg* 1989: 16.5, Store Vildmose (NJ). – 1990: 1. og 3.6, Arup Vejle (NJ). – 1991: 17.5, 2 eks., Gjerrild Nordstrand (OJ).
Middelhavssstenpikker *Oenanthe hispanica* 1991: 30.8, Kettrup Bjerger (NJ).
Stribet Græshoppesanger *Locustella lanceolata* 1991: 14.10, Christiansø (B). 16.10, Christiansø (B).
Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* 1991: 1.6, Kettrup Bjerger (NJ).
Fyrremejse *Parus montanus* 1991: 10.3, Gribskov (S).

Observatørliste

Ivan Abramowitz IA, Ole Amstrup OA, Jens Frimær Andersen JFA, Niels Andersen NA, Tim Andersen TA, Uffe Damm Andersen UDA, Niels Peter Andreasen NPA, Jens Bagger JBA, Jens Ballegaard JBg, Jørgen Bech JB, Preben Berg PB, Bjarne Bertel BB, Kim Biledgaard KB, Alex Bühring AB, Lars Borup LB, Lasse Braae LaB, Henrik Holm Brsk HHB, Roberto Brunocardi RB, Helge Røjle Christensen HRC, Jan Hjort Christensen JC,

Kim Christensen KC, Knud E. Christensen KEC, Rolf Christensen RoC, Jørgen Hulbak Christiansen JHC, Erik Christophersen EC, Hans Christophersen HC, Michael Clausen MC, Jacob Dall JD, Mark Desholm MD, Jan Durinck JaD, Svend Dyb-kjær SD, Erik Ehmsen EEh, Erik Enevoldsen EE, John Erik Ekberg JEE, John Faldborg JF, Flemming Falk FF, Kim Fischer KF, Vivian Foldager VF, Alex Sand Frich ASF, Jens Fromsejer JeF, Jes Graugård JG, Michael B. Grell MBG, Anders Hansen AH, Flemming Hansen FH, Jørgen Hansen JH, Mogens Hansen MHa, Kjeld Hasselstrøm KH, Casper Henriksen CH, Mogens Henriksen MH, Christian Hjort CHJ, Claus Hornemann CaH, Bent Jacobsen BJ, Lars Bo Jacobsen LBJ, Arve Jensen AJ, Frank Hammer-Jensen FJH, Erik Jeppesen EJ, Sune Jepsen SJ, Thomas W. Johansen TWJ, Michael Fink Jørgensen MFJ, Morten Jørgensen MJ, Ole Gylling-Jørgensen OGJ, Per Kjær PeK, Jens Kristian Kjærgård JKK, Henrik Knudsen HK, Peter Kristensen PK, Sebastian Klein SK, Leif Larsen LL, Peter Ellegaard Larsen PEL, Mikkel Lausten ML, Jens Lind JL, Jon Lehmberg Jol, Jens Lilleør JLi, Svend Aage Linderstrøm SAL, Martin Lund MLu, Peter Lüticheau PL, Peter Lyngs PL, Olvar Læssøe OL, Jens Tøftelund Madsen JTM, Hans Meilstrup HM, Hans Meltofte HsM, Thorkild Michaelsen TM, Peter Mähl PM, Henrik Haaning Nielsen HHN, Søren H. Nielsen SHN, Max Ejvind Nitschke MEN, Karsten Norgaard KN, Carsten Olsen CO, Erik Overlund EO, Lars Paaby LP, Bent Bøggild Pedersen BBP, Carsten E. Pedersen CEP, John Pedersen JP, Jørgen Munck Pedersen JMP, Knud Pedersen KP, Lennart Pedersen LeP, Per E. Pedersen PEP, Peter J. Petersen PJP, Birgit Persson BP, Arne Persson AP, Stefan Pihl SP, Lars Pommerencke LPo, Henrik Rask HR, Lars Rask LR, Brian Rasmussen BR, Erik Vikkelsø Rasmussen EVR, Palle A.F. Rasmussen PAFR, Eric Schaumburg ES, Hans Henrik Schou HHS, Terje Seidenfaden TeS, Jan Speiermann JS, Knud Erik Strange KES, Steen Søgård SS, Erik Holm Sørensen EHS, Torben Sørensen TS, Trine Theut TT, Kasper Thorup KT, Mikkel Thorup MT, Ole Thorup OT, Peter Thygesen PT, Michael Trasborg MT, Bo Tureby BT, Rasmus Turin RT, Kurt Willumsen KW, Hans Ægidius HÆ, Bert Østerby GO, Egon Østergaard EO.

Summary

Rare birds in Denmark and Greenland in 1991

In 1991 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 189 records of which 81% were accepted.

For each record the following details are included: 1) year and date, 2) locality (see map for regions), 3) number of individual birds if more than one, 4) other details if known (sdr.= summer plumage, vdr.= winter plumage, odr.= transition plumage), K = calendar year, fundet død = found dead, ringm. = ringed, and 5) initials of observer(s).

The three numbers in brackets after the species name refer to, respectively, the number of records (not individuals) before SU was established in 1965, the number of accepted records prior to this report, and the number of accepted records in the current report.

Two species new to Denmark were recorded in 1991: Saker *Falco cherrug* and Pied Wheatear *Oenanthe ple-shanka*. The first record of the subspecies *Motacilla flava feldegg* was accepted from 1989. Also accepted were the second records of Black-browed Albatross *Diomedea melanophris* and Paddyfield Warbler *Acrocephalus agricola*, the third record of Yellow-breasted

Bunting *Emberiza aureola*, the fourth record of Lanceolated Warbler *Locustella lanceolata*, the first record of Little Bustard *Tetrax tetrax* since 1959, the fourth and fifth record of Dark-throated Thrush *Turdus ruficollis atrogularis*, the fifth record of Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*, and the fifth and sixth records of Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*.

The only Danish record of Spectacled Warbler *Sylvia conspicillata* has been deleted; the bird, ringed 20.9 1976 at Christiansø, is now believed to have been an adult female Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* and has been accepted as such (Olsen 1991).

A list of corrections to Rarities Report No. 20 (Frich & Nordbjærg 1992) is found at the end of this report.

Referencer

Alström, P. 1989: Identification of marsh terns in juvenile and winter plumages. – British Birds 82: 296-319.
Alström, P. 1991: Fältbestämning av *Chlidonias*-tärnor. – Vår Fågelvärld 50(5): 56-59.
Alström, P., P. Colston & L. Lewington 1991: A field guide to the rare birds of Britain and Europe. – Domino Books Ltd.
Barthel, P.H. 1992: Die Bestimmung östlicher Unterarten des Schwarzkehlchens *Saxicola torquata*. – Limicola 6: 217-241.
Berg, H.M. 1992: European news. – British Birds 85: 447.
Breife, B., E. Hirschfeld, N. Kjellén & M. Ullmann 1990: Sällsynta fåglar i Sverige. – Sveriges Ornitologiska Förening.
Burgers, J., J.J. Smit & H. van der Voet 1991: Origins and systematics of the two types of the Bean Goose *Anser fabilis* (Latham 1787) wintering in the Netherlands. – Ardea 79: 307-316.
Chandler, R.J., R.A. Hume, M.A. Ogilvie, R.J. Pytherch & J.T.R. Sharrock 1993: British Birds 86: 1-2.
Christensen, R., M. Munk, H. Skov & J. Smidt 1990: Fugle i Danmark 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 105-144.
Christensen, R. 1991: Artsbestemmelse af Flamingoer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 97-100.
Christensen, R. 1992: Flamingoernes forekomst i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 123-127.
Cramp, S. & K.E.L. Simmons (red.) 1977: The birds of the Western Palearctic, Vol. 1. – Oxford University Press.
Dybbro, T. 1978: Oversigt over Danmarks fugle. – DOF, København.
Elmberg, J. 1991: Sällsynta fåglar i Sverige 1990. – Vår Fågelvärld 50(8): 15-30.
Elmberg, J. 1992: Sällsynta fåglar i Sverige 1991. – Vår Fågelvärld 51(7-8): 17-32.
Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.
Hirschfeld, E. 1988: Sällsynta fåglar i Sverige 1987. – Vår Fågelvärld 47: 443-462.
Jännes, H., P.J. Nikander & T. Numminen 1991: Raritetkomiteen Hyväksymät vuden 1990 Harvinaisuushavainnot. – Lintumies 26: 241-262.
Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: 109-120.

Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.
Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-150.
Olsen, K.M. 1990a: Flodsangeren *Locustella fluviatilis* i Danmark, med noter om feltbestemmelse. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 15-20.
Olsen, K.M. 1990b: To former af Sædgæs forekommer i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 91-93.
Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle – en oversigt. – Dansk Orn. Foren.
Riddiford, N. & P.V. Harvey 1992: Identification of Lanceolated Warbler. – British Birds 85: 62-78.
Rogers, M.J. & the Rarities Committee 1988: Report on rare birds in Great Britain in 1987. – British Birds 81: 535-596.
Rogers, M.J. & the Rarities Committee 1989: Report on rare birds in Great Britain in 1988. – British Birds 82: 505-563.
Rogers, M.J. & the Rarities Committee 1991: Report on rare birds in Great Britain in 1990. – British Birds 84: 449-505.
Rogers, M.J. & the Rarities Committee 1992: Report on rare birds in Great Britain in 1991. – British Birds 85: 507-555.
Skov, H., M. Munk, R. Christensen, P. Lindballe & J. Smidt 1992: Fugle i Danmark 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 209-242.
Tyrberg, T. 1992: Fågelrapport för 1991. – Vår Fågelvärld 51(7-8): 33-63.

Rettelser til SU-rapport nr 20, DOFT 86: 107-122, 1992

Corrections to Rarities Report No. 20, DOFT 86: 107-122, 1992
Purpurhejre 1981: skal være *IK*.
Halsbåndstroland: (-2,1) skal være (0,2,1).
Stellersand 1990: 22.4-7.5 Hirsholmene (NJ) skal være *han og hun*.
Sorthovedet Måge 1990: 16.3, Farø Rasteplads (S) skal være (*LFM*).
Slørugle: opsummering mangler, skal være (0,0,2).
Korttået Lærke: "Saltholm 1" skal være *Flakfortet 1*.
Buskrørsanger 1990: 1.6, Christiansø tilføjes som observatør *MFJ*.
Lundsanger 1990: 2.6-1.8, Christiansø (B), 20 eks.: 3.6 skal være 3, 10.6 6, 11.6 5, og efter "12.6 4" tilføjes *13.6 3*.
Observatørliste: BT mangler, skal være *Bo Tureby*.

Antaget 8. februar 1993

Alex Sand Frich	Lars Nordbjærg
Nyvej 63, 2.tv	Eibagade 18, 1. th
2620 Albertslund	2300 København S