

søger også at få styr på de historiske årsager. Det sker især ved DNA-studier, i samarbejde med Peter Arcander, Mike Roy og Jaime García-Moreno.

#### Nye forklaringer på tropisk artsrigdom

Det har i 25 år været "god latin", at årsagen til tropeskovenes biologiske mangfoldighed skal søges i artsinddeling i bestande af oprindelige arter, der var blevet isolerede i "skovrefugier" under istidspæderne. Ved at sammenligne udbredelser og DNA-data kan vi vise, at de fleste lavlandsområder bebos af arter, som bedst kan betragtes som overlevende fra den langt mere artsrige "super-regnskov", som fandtes længe inden istidspæderne. Tropeskovens artsrigdom kan i vid udstrækning forklares ved akkumulation af arter over meget lange tidsrum og store arealer, og ved en stadig omfordeling i forhold til de aktuelle miljøforhold (landskabskompleksitet m.m.). De fleste arter er vidt udbredte, idet de har kunnet flytte og tilpasse sig en foranderlig verden, hvor klimaet skifter og flodsletterne til stadighed omlægges.

Udpegning af nationalparker og andre fredede områder er i høj grad et spørgsmål om politisk oportunitisme, idet man vælger områder med få mennesker. Disse fredninger har været nødvendige for at bevare Afrikas store pattedyr. Vore analyser både for Afrika og Sydamerika viser imidlertid, at man i forhold til den samlede biodiversitet generelt har valgt de forkerte områder. Man har næsten systematisk udvalgt steder med vidt udbredte arter og undgået at beskytte steder med mange endemier. Det skyldes, at de biologisk mest unikke steder generelt ligger umiddelbart i nærheden af gamle befolkningscentre.

Årsagen ligger formentlig i, at både dyr og mennesker har kunne drage fordel af nogle specielle lokale forhold. Det drejer især om bjergområder med permanent tågedannelse, som sikrer stabil vandforsyning til tilstødende bassiner, hvor balancen mellem nedbør og fordampning skaber frugtbar jord. Bestemte bjergrygge vil desuden beskytte mod unormale vejrforhold (f.eks. sydpolarvinde). F.eks. er det sandsynligt, at visse bjergområder i Tanzania var permanent påvirket af varme og fugtige vinde fra det Indiske Ocean gennem millioner af år. Derfor har disse bjerge en række unikke fuglearter, som f.eks. Udzungwa-skovhønen (se *Fug-*

le 1992(3): 12-15; DOFT 88: 97-98, 1994), hvis slægtsmange lever i SØ Asien. Det viser sig, at steder med sådanne reliktarter også spillede en særlig rolle for udviklingen af nye arter.

Analyse af artsudbredelser, økologiske data og befolkningsdata er et uvurderligt redskab for artsbevarelse. Men i øjeblikket er dette kun muligt i nogle begrænsede områder. BirdLife's projekt er enestående ved at være den første analyse, hvor hele verden dækkes med en veldefineret metodik. Om ti år, med IBA-projektet og mere detaljerede analyser ved ZM, kan vi målrette indsatsen for at bevare verdens biodiversitet endnu mere præcist.

Et af de vigtigste resultater af vore analyser ved Zoologisk Museum er, at det ikke er nok at udpege nogle store mennesketomme nationalparker. Vi må sætte ind i en række områder med stort befolkningspres og støtte de lokale befolkninger til at udnytte naturen uden at ødelægge den. Mange af BirdLife's projekter indeholder langt mere udviklingshjælp end fuglestudier, og det samme vil vi givevis også opleve med mange af de projekter. DOFT i disse år påbegynder rundt om i verden.

Stattersfield, A.J., M.J. Crosby, A.J. Long & D.C. Wege 1998: Endemic Bird Areas of the World - priorities for biodiversity and conservation. - BirdLife International, Cambridge (846 sider, £ 37).

#### Anden litteratur:

Fjeldså, J., F. Ehrlich, E. Lambin & E. Pons 1997: Are biodiversity "hotspots" correlated with current endemism? A pilot study using the NOAA-AVHRR remote sensing data. - Biodiv. Conserv. 6:401-422.

Fjeldså, J. & C. Rahbek 1997: Species richness and endemism in South American birds: implications for the design of networks of nature reserves. Pp 466-482 i W.F. Laurance & R.O. Bierregaard (red.): Tropical forest remnants: ecology, management and conservation of fragmented communities. - University of Chicago Press.

Fjeldså, J. & C. Rahbek in press: Continent-wide diversification processes and conservation priorities. I G.M. Mace, A. Balmford & J.R. Gimsberg (red.): Conservation in a changing world. Integrating processes into priorities for action. - Cambridge University Press.

Hjarsen, T., C. Rahbek & J. Fjeldså 1998: At frede rigtigt. - Udvikling 1998(2): 30-33.

## Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997

PALLE A. F. RASMUSSEN



Rapport nr 27 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 1997)

### Indledning


I denne rapport for 1997 er 225 sager for Danmark og Grønland færdigbehandlet, heraf 178 fra 1997.

Ca. 80% af de behandlede sager blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 75 og 85 de seneste fem år. Derudover har SU på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner behandlet og godkendt 5 sager vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt, og endelig har SU behandlet og godkendt et forårsfund af Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*. Disse fund publiceres ikke i nærværende rapport, men i stedet i den landsdækkende årsrapport i DOFT og i lokalrapporterne; se Rasmussen (1997) angående denne nye praksis.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Rasmussen 1997). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første fjerdragt efter pullusdragten), pull. = pullus (dununge), sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet tre tal: 1) antal anerkendte fund før 1. januar 1950, 2) antal

anerkendte og SU-godkendte fund fra og med 1. januar 1950 til og med 1996, 3) antal godkendte fund i 1997. Bemærk ændringen af opsummeringen i forhold til de seneste rapporter, hvor der nu skelnes mellem fund før 1.1.1950 (første tal i opsummeringen) og efter 1.1.1950 (andet tal i opsummeringen). Denne ændring skyldes en tilpasning til den standard som anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). I nærværende rapport har det dog af forskellige årsager ikke været muligt at gennemføre denne ændring for følgende arter: Slangem, Steppehøg, Jagtfalk, Triel, Sneugle, Høgeugle, Ellekrage.



Regionsinddelingen anvendt i denne artikel.  
Geographical regions of Denmark used in this report.

det har været nævnt i tidligere SU-rapporter forventes den nærmeste fremtid på grund af en generel stor usikkerhed om systematik og felbestemmelse. Imidlertid er en artikel om felbestemmelse af disse former under udarbejdelse af danske forfattere. Det forventes at denne artikel publiceres i DOFT, og SU vil i den forbindelse tage stilling til de forskellige formers forekomst og status herfter.

Hvidrygget Ryle ad., Ulfshale, Møn 27. maj 1997. Teeming: Niels Peter Andreasen

og Sydlig Blåhals, Hvidhalset Fluesnapper og Kragneb. For disse arter gælder derfor indtil videre, at de hidtil anvendte opsummeringer, hvor der anføres en enkelt fund, er forkerte. De første tal i opsummeringen mellem fund før 1.1.1965 (første tal i opsummeringen) og efter 1.1.1965 (andet tal i opsummeringen). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke af nogle arter regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som fem fund.

Som noget nyt er der fra og med denne rapport offentliggjort observatørnavnet oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (F), videofilm (V) eller håndoptagelse (B). Desuden er finderen ved hvert fund markeret med et asterisk (\*) foran observatørnavnet. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne hvem finderen er, og der kan derfor på nærværende rapport mangle enkelte markeringer. Fremover bør man i beskrivelserne til SU angive finderen, her defineret som den eller de observerter, der var til stede, da fuglen blev opdaget.

Bagest i rapporten findes en liste over forkastede fund samt rettelsel til tidligere SU-rapporter.


**Godkendte sager**

Fra 1997 godkendes Sumpvibe og Sibirisk Allike som nye arter for landet. Andre bemærkelsesværdige jagttagelser fra 1997 var andengæsefund af Lille Skråpe, Lille Bjergand, Ørtekondompap og Hvidkindet Værfling. Desuden var der rekordmange jagttagelser af Middelhavsskråpe og Rødrygget Sval, og flere jagttagelser af Amerikansk Tundrahjelle. Endelig vil 1997 nok især blive husket for den enestående invasion og de efterfølgende yngleforkomster af Hvidvinget Terne. Som ny race for landet godkendes endvidere Islandsk Vindrossel fra 1995.

**Henlagte sager**

Fra tiden frem til udgangen af 1997 henligger der 18 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over de henlagte sager er vist bagest i rapporten.

Hertil kommer sager vedrørende Sølvmåge af formerne *Larus argentatus cachinnans/michahellis* samt Sildemåge af formen *L. fuscus heuvelini*. Som



Ørkenstempikker 2K 2, Nordenhu-  
se, Fyn 19. marts 1997.  
Foto: Søren Nygaard.

## SU-listen

Fra og med 1999 skal Rødhalsset Gås *Branta ruficollis* ikke forelægges SU. Denne lebestemmelige art iagttages nu regelmæssigt herhjemme, især i de store våde områder i Vadehavsområdet og langs den jyske vestkyst i vinterhalvåret. Efter genbehandling anerkendes landets eneste fund af Sortbrun And *Anas rubripes* ikke længere, og arten er hermed udgået af den danske liste. Til SU-listen, som blev publiceret i den seneste SU-rapport (Rasmussen 1997), føjes Guldspætte *Colaptes auratus*; et fund af denne art fra maj 1972 er godkendt af SU (Hansen et al. 1974), og er omtalt af Dybbro (1978), mens mangler i Olsen (1992). Endvidere tilføjes ubestemt albatros, fregattfugl, krigsørn og bjergløvsanger til listen over ubestemte fugle, som bør behandles af SU. Det skal desuden bemærkes, at SU også behandler hybridkønnes af hybridiseringer har fundet sted i naturen. Se endvidere afsnittet Kategorier.

## Kategorier

Som en tilpasning til AERC-standard inddeles de i

Danmark trufne fuglearter fra og med denne rapport i 5 forskellige kategorier. Definitionen for de enkelte kategorier er følgende:

A) Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1.1 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pipeband.

B) Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1.1.1950; f.eks. Kravetrappe og Steppevibe.

C) Udsatte og undslupne arter som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan.

D) Arter der ikke betragtes som spontant optrædende fordi det vurderes som mest sandsynligt, at de er undsluppet fra fangenskab eller på anden måde unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Kalkungrib og Gulstrubet Værting.

E) Arter som med sikkerhed er undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Dværgsnegås med farveringe og Steppørn med stropper.

SU vil fremover behandle fund af arter fra alle kategorier, og for at få så fyldsigstrende et billede som muligt af de forskellige arters optræden her i regionen er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog nødvendigvis forekomme tilfælde, hvor det må skønnes at et fund er uden større interesse, f.eks. fund af eksotiske arter fra Australien og Afrika (Sort Svane, Undulat, glansstætte m.m.). Er man i tvivl om hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Den officielle danske liste udgøres herfter af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporterne.



### Sjældenhedsudvalgets medlemmer

SU bestod frem til udgangen af 1997 af følgende: Erik Christophersen (sekretær, indtil foråret 1998), Jan Hjort Christensen, Henrik Knudsen, Henrik Haaning Nielsen, Klaus Malling Olsen, Knud Pedersen (sekretær), Brian Rasmussen, Palle A. F. Rasmussen og Ole Thorup. Erik Christophersen udtrådte af udvalget i foråret 1998 og Ole Thorup i efteråret 1998. Begge takkes for godt arbejde og mange gode og seriøse diskussioner. Som nye medlemmer er Troels Eske Ortvad og Kasper Thorup tiltrådt i foråret 1998 og Ole Amstrup i efteråret 1998.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Ole Amstrup, David Boertmann, Henrik Knudsen, Jan Hjort Christensen, Klaus Malling Olsen, Knud Pedersen, Brian Rasmussen, Kasper Thorup og Ole Thorup. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

**Sjældenhedsudvalgets adresse** er: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.

### Systematisk gennemgang af de godkendte sager

#### Accepted records

#### Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii* (4,156,-)

1985: 26.5, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K raste, senere trk., \*Christian Leth.  
Fra foråret 1985 er der tidligere godkendt 14 fund af Hvidnæbbet Lom ved Skagen, se Rasmussen (1996). Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

#### Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* (0,24,3)

1997: 28.7, Grenen, Skagen (NJ), 2 eks., trk., \*Erik Holm Sørensen. – 17.9, Kikhavn, Hundested (S), trk., \*Michael Trasborg. – 3.10, Blåvandshuk (RB), trk., \*Kasper Thorup m.fl.

#### Middelhavsskråpe *Puffinus puffinus* (1,17-18,7)

1997: 7.9, Ørhage (NJ), trk., \*Lars Raunsgaard. – 9.9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., \*Henrik Haaning Nielsen m.fl. – 11.9, Grenen, Skagen (NJ), \*Knud Pedersen, \*Lars Hansen. – 13.9, Ørhage (NJ), trk., \*John K. Kyed, \*Jens Jørgen Andersen. – 15.9, Grenen, Skagen (NJ), 2 eks., \*Knud Pedersen m.fl. – 19.9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., \*Thomas Varto Nielsen m.fl. – 7.10, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., \*Finn Lund Henriksen, \*Flemming Falk m.fl.

Med hele 7 fund af 8 individer er 1997 det hidtil bedste år for arten herhjemme. Det er bemærkelsesværdigt, at alle årets fund er fra Nordjylland. Se desuden kommentarer i Rasmussen (1997).

#### Lille Skråpe *Puffinus assimilis* (1,0,1)

1997: 18.6, Nordsøen, \*Martin Vestergaard.  
Den pågældende fugl blev iagttaget fra skib i den danske del af Nordsøen ca. 300 km vest for Esbjerg. Det eneste tidligere danske fund er fra 18.9.1912, hvor en adult ♀ blev indsamlet i Skagerrak (Hørring 1942).

Arten yngler nærmest på øer i den mellemste del af Atlanterhavet, hvor den menes at være til siede størstedelen året. Arten kan imidlertid tænkes at være noget mere mobil end tidligere antaget. Den træffes blandt andet regelmæssigt ved de Britiske Øer, hvor der til og med 1995 foreligger omtrent 100 fund, flest mellem maj og oktober (Evans 1994, Rogers et al. 1995, 1996). Desuden er den truffet mindst 15 gange i Frankrig og 5 gange i Tyskland (Alström et al. 1991), hvortil der ingen fund er fra f.eks. Norge og Sverige.

Den danske fugl fra 1912 samt 9 racebestemte fugle fra de Britiske Øer havde alle karakterer svarende til sp. *boroli* (Hørring 1942, Evans 1994). Denne form yngler på Azorerne, Madeira og de Kanariske Øer, og det er nok udelukkende fugle herfra der lejlighedsvis optræder i de vesteuropæiske farvande.

#### Nathejre *Nycticorax nycticorax* (3,15,1)

1997: 13.6, Røghøjle Sø, Lolland (LF), 3K+, \*Klaus Malling Olsen, \*Anette Friis, \*Jens T. Madsen.  
Andet år i træk med fund af arten herhjemme.

#### Tophejre *Ardeola rallioidea* (2,5,0)

1971: februar, Lammefjorden nær Holbæk (S), ad. fundet død, via Palle A. F. Rasmussen.  
1995: 25.6, Grønningen, Fanø (RB), \*Kim Fischer.  
Fundet fra februar 1971 er omtalt af Dybbro (1978) og Olsen (1992), men er først nu behandlet og godkendt af SU. Den pågældende fugl var ringmærket som redeunge i juni 1963 i Kyst-Agachukii reservatet i Sydrusland. Da den blev fundet i februar var fuglen allerede i delvis opløsning, så den er givetvis kommet til landet noget tidligere end fundtidspunktet angiver. Fundet fra 1995 er det første herhjemme siden 1987.

#### Knortegås *Branta bernicla*

Med karakterer svarende til Sortbrøget Knortegås ssp. *nigricans* (0,5,1):  
1996: 13.11, Indvindingen, Vester Vedsted (RB), ad., \*Ole Thorup.

1997: 26.9-5.12, kyststrækningen mellem Voer- så og Geræa, Sydøstvendssø (NJ), ad., \*Palle A. F. Rasmussen, Terje Seidenfaden.  
Med disse to fund er formen nu truffet tre år i træk her-

hjemme. Fundet fra Nordjylland i 1997 er i øvrigt det første uden for Sydvestjylland. Se endvidere kommentarer i Rasmussen (1997).

#### Rødhalsed Gås *Branta ruficollis* (6,21,5)

1996: 16-18.10, Filsø (RB), ad., Morten Benzon Hansen m.fl.

1997: 26.1, Ballum Enge (SJ), 2 eks., \*Morten Benzon Hansen, Hans Harestrup Andersen m.fl. – 28.1, 2 eks., Ballum Enge (SJ), \*Søren Gjaldbæk, \*Niels Larsen, \*Michael Mosebo. – 29.1, Ballum Enge (SJ), \*Jesper Nelby Kristiansen via Morten Benzon Hansen. – 30.1, 3 eks., Ballum Enge (SJ), \*Morten Benzon Hansen m.fl. – 1.2, Ballum Enge (SJ), 2 eks., \*Morten Benzon Hansen, Martin Jessen, Orla Jessen m.fl. – 2.2, Astrup Enge, Skærbæk (SJ), \*Søren Nygaard, \*René Christensen (F). – 5.2, Ballum Enge (SJ), \*Niels Larsen m.fl. (F). – 28.2, Ballum Enge (SJ), via Morten Benzon Hansen. – 1.3, Ballum Enge (SJ), 3 eks., \*Morten Benzon Hansen m.fl. – 30.3, Rudhøj Kog (SJ), 2 eks., \*Morten Benzon Hansen m.fl. – 17.11, Kilen, Struer (RK), 2 eks., trk., \*Helge Røjle Christensen. Fundet fra 1996 er tidligere godkendt, men kun for 17.10 (Rasmussen 1997).

Forekomsten i Vadehavsområdet i Sønderjylland i 1997 omfattede mindst fem forskellige individer, som på grund af forskelle i dragen kunne adskilles fra hinanden. To fugle set sammen i dette område ved flere lejligheder gennem hele vinteren var givetvis et par, og regnes kun som ét fund i opsummeringen. I øvrigt er 1997 med 5 fund af 7 individer det hidtil bedste år for arten herhjemme.

#### Amerikansk Pibeand *Anas americana* (0,6,1)

1996: 15.4-25.5, Sønderland, Rømø (SJ), ad. ♂, Morten Benzon Hansen m.fl.

1997: 19.4, Margrethe Kog (SJ), ad. ♂, \*Martin Kviesgaard, \*Egon Mogensen, \*Stinne Aastrup. Fundet fra 1996 er tidligere godkendt, men kun for perioden 15.4-12.5 (Rasmussen 1997). Fundet fra 1997 er det andet fra Vadehavsområdet i Sønderjylland, de øvrige er fra Nordjylland (2) og Ringkøbing Amt (3). I øvrigt er det fjerde år i træk arten træffes herhjemme.

#### Pibeand/Amerikansk Pibeand *Anas penelope americana*

1997: 29.6, Sneum Sluse (RB), hybrid ♂ i fældning til eklipsdragt, \*Klaus Malling Olsen m.fl.  
Det er første gang SU har godkendt et fund af denne type. Det pågældende fund understreger imidlertid, at der bør udvises stor forsigtighed ved bestemmelse af Amerikansk Pibeand herhjemme. I øvrigt skulle en hybrid Pibeand/Amerikansk Pibeand ♂ være set gentagne gange i Vadehavsområdet mellem oktober 1996 og oktober 1997, men SU har kun modtaget dokumentation for den ovennævnte dato.

### Krikand *Anas crecca*

Med karakterer svarende til Amerikansk Krikand ssp. *carolinensis* (0,10,1):


1997: 1.5, Solbjerg Engsø, Kagerup (S), ad. ♂, Jan Hjort Christensen m.fl.

Helt usædvanligt sås der samtidigt på den samme lokalitet en Blåvinget And ♂. I øvrigt er det tredje år i træk for men optræder herhjemme.

### Sortbrun And *Anas rubripes* (0,0,0)

Det hidtil eneste danske fund (Hammeren (B) oktober 1988) anerkendes efter genbehandling i ke længere, og arten er hermed udgået af den danske liste. Fundet er nævnt i Olsen (1992).

Carl Chr. Tofte, 28/4 1997.



### Blåvinget And *Anas discors* (1,8,3)

1997: 26.4-14.5, Solbjerg Engsø, Kagerup (S), ad. ♂, Carl Christian Tofte m.fl. (F). – 18-22.5, Tryggevle Nor (F), ad. ♂, Søren Nygaard. – 30.5-13.6, Hindemaj, Haderslev (SJ), ad. ♂, Søren Nygaard, Michael Bladt, Knud Fredsøe, Michael Mosebo Jensen m.fl. (F).  
Tre fund fra samme år er helt uhyørb herhjemme, og de tre forekomster kunne tænkes at vedrøre det samme individ. Iagttagelserne er dog her regnet som tre særskilte fund. Der er kun ét tidligere fund uden for Jylland: 5.5 og 16.5 1981 Borreby Mose på Sjælland (Pedersen 1984). De tyske fund er fordelt med 4 i Nordjylland, 2 i Ringkøbing Amt og 3 i Sønderjylland. I øvrigt var de to fund, som blev omtalt i forrige SU-rapport (Rasmussen 1997), begge fra Sønderjylland: fundet fra 1995 var således det andet og ikke som angivet det første i Sønderjylland.

### Hvideøjet And *Aythya nyroca* (4,19,2)

1992: 8.2-18.3, Haderslev Inderdam (SJ), ad. ♂, \*Carsten Olsen, Morten Benzon Hansen m.fl.  
1997: 27.4-1.5, Bunken, Skagen (NJ), ad. ♂, \*Ejgil Tøp Olsen, \*Jan Kahne, Knud Pedersen m.fl. (F). – 13.5-14.7, Vejlerne (NJ), ad. ♂, \*Palle A. F. Rasmussen m.fl.

Fundet fra 1992 er tidligere godkendt, men kun for 18.3 (Frich & Nordhøj 1994). Beskrivelserne sammenholdt med fotos viser, at de to fund fra Nordjylland i 1997 helt sikkert drejer sig om to forskellige individer.

**Lille Bjergand** *Aythya affinis* (0,1,1)

1997: 25.3-16.4. Harboør Tange (RK), ♀, \*Palle A. F. Rasmussen, \*Henrik Haaning Nielsen, Klaus Malling Olsen m.fl. (F).

Andet danske fund af denne nordamerikanske art: det første er fra Bygholm Vejle i Nordjylland, hvor en adult ♂ sås 5.7.5 1985 (Rasmussen 1996). Arten er til og med 1996 truffet omkring 30 gange i Europa, heraf ca 15 gange på de Britiske Øer (Evans 1996), men det eneste tidligere fund af en hun i Europa er fra november 1996 i England (Flamm 1996). Det første vestpalearktiske fund af en hun er fundet i det tidlige fra de Kanariske Øer, hvor en hun sås på Tenerife fra november 1994 til februar 1995 (Clarke et al. 1995).

**Brilleand** *Melanitta perspicillata* (0,14,2)

1997: 20-22.6. Blåvandshuk (RB), ad. ♂, \*Per Kjær, Søren Haaning Nielsen, Michael Bjerregaard m.fl. – 16.9-15.10. Blåvandshuk (RB), ad. ♂, \*Henrik Mouritsen m.fl. – 5.10. Lille Strand (NJ), 2K+ ♂ trk., \*Thomas Varto Nielsen.

De to forekomster ved Blåvand menes at dreje sig om samme individ, og er derfor kun regnet som ét fund i opsummeringen. Se i øvrigt kommentarer i Rasmussen (1996) vedrørende den geografiske og tidsmæssige fordeling af de danske fund.

**Slangøørn** *Circus gallicus* (-,17,2)

1997: 1.9. Stignæs (S), trk., \*Torben Evald. – 26.9. Højrup, Stevns Klint (S), trk., \*Tim Andersen m.fl.

**Steppehøg** *Circus macrourus* (15,52,4)

1997: 28.4. Nordstrand, Skagen (NJ), 2K+ ♀, rastende, senere trk., \*Knud Pedersen, \*Kurt Rasmussen m.fl. (F). – 25.5. Jydelejet, Møn (M), 2K+ ♀, \*Peter Koch m.fl. – 26.5. Bødkermosen, Møn (M), 2K+ ♀ trk., \*Jan Blichert-Hansen, – 2.6. Hellebæk Avlsgrd, Hellebæk (S), 2K+ ♀ trk., \*Steen Søgaard. – 29.6. Skallingen (RB), 2K ♀, \*Klaus Malling Olsen m.fl.

Agtagelserne på Møn 25.5 og 26.5 regnes kun som ét fund i opsummeringen, idet der givetvis har været tale om samme individ. Fire fund fra et enkelt år er flere end normalt, men dog ikke enestående: senest har der blandt andet været 7 fund i 1992 og 5 fund i 1993.

**Ørnevåge** *Buteo rufinus* (1,6,1)

1996: 15.8. Sønderho, Fanø (RB), 1K trk., \*Kim Fischer. – 27.8. Bødkermosen, Møn (M), antagelig ad., \*Per Schiermacker-Hansen, Freddy Jørgensen.

1997: 29.6. Lille Vildmose (NJ), antagelig ad., \*Uffe Gjøel Sørensen, \*Erling Krabbe, \*Jens Friemer Andersen.



Ørnevåge, Lille Vildmose 29. juni 1997. Tegning: Jens Frimer Andersen.

Fuglen på Fanø i 1996 regnes som den samme, der tidligere er godkendt fra Blåvandshuk 12-15.8 1996 (Rasmussen 1997), og finder er derfor ikke opsummeret. Som omtalt i Rasmussen (1997) skal de seneste danske fund nok ses i sammenhæng med, at arten træffes stadig hyppigere i f.eks. Østerg og Ungarn, især i perioden juni-august.

**Lille Skrigøørn** *Aquila pomarina* (9,70-72,2)

1992: 31.5. Fakkebjerg, Sydlangeland (F), ad. trk., \*Hans Lehmann Egidius.

1995: 12.9. Gedser Odde (LF), imm. trk. fors., \*Thomas W. Johansen m.fl.

1996: 26.9. Fakkebjerg, Sydlangeland (F), imm. trk., \*Jan Holm Jensen (F).

1997: 8-9.5. Rørvig (S), ad., \*Erik Vikkelso Rasmussen m.fl. – 1.6. Råbjerg Mose (NJ), ad. trk., \*Erik Christophersen, \*Lars Thorhauge Rask.

Med agtagelsen fra 1992 kommer totalen dette år op på 13 fund, det hidtil højeste tal herhjemme. Fuglen ved Gedser Odde 12.9 1995 kunne være identisk med den tidligere er godkendt fra Hyllekrog på Lolland 15.9 1995 (Rasmussen 1997), men er dog her regnet som et særskilt fund. Fuglen ved Rørvig 1997 sås på træforsøg sidst på eftermiddagen 8.5, hvorefter den gik ned til rast i området. Næste formiddag lettede den og trak kort efter mod øst.

**Stor Skrigøørn** *Aquila clanga* (3,37,1)

1988: 24.10. Højrup, Stevns Klint (S), 3K+ trk., \*Kurt Willumsen, \*Lennart Pedersen.

1997: 20.9. Dueodde (B), ad. trk., \*Jens Christensen, \*Tommy Kruse, \*Per C. Pedersen.

**Lille Skrigøørn/Store Skrigøørn** *Aquila pomarina/clanga*

1997: 9.5. Hellebæk Avlsgrd, Hellebæk (S), trk., \*Steen Søgaard, \*Gert Østerbye m.fl.

Den pågældende fugl kunne være identisk med den Lille Skrigøørn, som forlod Rørvig ca tre timer tidligere samme dag.

**Steppeørn** *Aquila nipalensis* (0,15,1)

1997: 16.10. Højrup, Stevns Klint (S), 3K+ trk., \*Troels Eske Ortvad m.fl. (F).

Den pågældende fugl er givetvis identisk med den fugl, der sås ved Falsterbo i Sverige 15-16.10 1997: på første-dagen sås den på træforsøg, og dagen efter trak den ud kl. 12.40. Fuglen ved Stevns blev set trække ind ca kl. 13.15. Det er det første fund herhjemme siden 1992, hvor der blandt andet sås en indtrækkende fugl på samme lokalitet 7.9 (Rasmussen 1997).

**Lille Tårnfalk** *Falco naumanni* (2,3,1)

1997: 16.10. Klydesøen, Amager (S), ad. ♂ trk., \*Morten Jørgensen.

De to seneste fund af arten herhjemme er fra 20.9 1986 ved Gedser Marinestation på Falslev (Olsen 1988) og 11.5 1981 ved Rubjerg Knude i Nordjylland (Pedersen 1984). De tre øvrige fund er fra november 1944, juni 1945 og oktober 1956 (Salomonsen 1963). Fundet fra 1956 er af Salomonsen (l.c.) og Dybbro (1978) (men ikke af Olsen (1992)), nævnt som en mulig undsluppet langeskabsfugl.

I oktober 1997 blev arten tillige truffet i Småland i Sverige, men her var der tale om en 2K ♂ (Gantlett 1998).

**Jagtfaalk** *Falco rusticolus* (41,53,4)

1980: 23-31.12. Fanø (RB), 1K, \*Kim Fischer.

1981: 5.2 og 21.2. Fanø (RB), 2K, \*Kim Fischer.

1993: 8.10. Sønderho, Fanø (RB), 1K trk., \*Kim Fischer. – 30.10. Sønderho, Fanø (RB), \*Kim Fischer.

1997: 1.2. Svinø Strand, Svinø (S), 2K, \*Lars Bardrum, \*Jens Bardrum, \*Bent Bardrum, – 1.2. Gavnbø (S), 2K, \*Tim Andersen, \*Jørgen Hulbæk Christiansen, – 20.4. Kvotrup Mose, Tilst (ÅH), 2K trk., \*Svend Møller Jensen, – 14.10. Vest Stadil Fjord (RK), 1K, \*Jørgen Ballegaard, \*Jens Ballegaard, – 15.11. Astrup Enge, Skærbæk (SJ), 1K, \*Søren Nygaard, \*Thor Bue Hansen, \*Michael Bladt.

Agtagelserne fra Fanø i december 1980 og februar 1981 vedrører det samme individ, og er kun regnet som ét fund i opsummeringen. Den trækkende fugl ved Sønderho på Fanø 8.10 1993 menes at være identisk med den tidligere er godkendt fra Skallingen i Ribe Amt 15-30.9 1993 (Frich & Nordbjærg 1995), og fundet er derfor ikke opsummeret.

ke opsummeret. Endelig regnes agtagelserne fra Svinø Strand og Gavnbø på Sjælland i februar 1997 kun som ét fund. Derudover skal bemærkes, at fuglen fra Sønderho på Fanø 30.10 1993 ud fra beskrivelsen ikke sikkert kunne aldersbestemmes.

**Triel** *Burhinus oedipnemus* (22,11,1)

1997: 19-21.11. Blåsbjerg, Vendsyssel (NJ), 1K, via Thorkil Duch (F).

Den pågældende fugl opholdt sig på en mark tæt ved en ejendom. Den 21.11 sås den i svækket tilstand, og senere samme dag blev den fundet død i ejendommens indkørsel.

**Sortvinget Braksval** *Glareola nordmanni* (2,2,1)

1997: 18-19.5. Tipperne (RK), ad., \*Ole Amstrup, Henrik Knudsen, Jens Ryge Petersen (F).

De kun fire tidligere fund herhjemme er alle fra Nordjylland, og de to seneste er begge fra Vejlerne: henholdsvis 14-23.6 1980 (Pedersen 1982, 1984) og 20-27.6 1987 (Olsen 1988).

**Amerikansk Tundrahøjle** *Pluvialis dominica* (0,2,4)

1997: 26.7. Lejodde, Korsør (S), ad. i sdr., anlagelig ♂, \*Jørgen Bech, – 2.9. Stignæs (NJ), ad. i sdr., \*Palle A. F. Rasmussen, – 4-16.9. Ølsømagle Revle (S), 2K, \*Knud Nielsen, Tim Andersen m.fl. – 21.9 og 24.9. Østerild Fjord og Hovsør Røn (NJ), 1K, \*Henrik Haaning Nielsen, John Kristensen Kyed.

Med blot to tidligere forekomster herhjemme, henholdsvis august 1991 og august 1996, er fire fund fra samme år meget overraskende. Sammenlignet med artens optræden på de Britiske Øer, hvor den er truffet ca 200 gange (Rogers et al. 1996), er juli-fundet usædvanlig tidligt, mens fundene fra august og september passer bedre med det britiske fundmønster. I Sverige derimod er halvdelen af de i alt 10 fund til og med 1996 fra juli, og i juli 1997 sås arten desuden i Holland (Gantlett 1998).

**Sibirisk Tundrahøjle** *Pluvialis fulva* (0,7,0)

1993: 11.9. Borreby Mose (S), 1K trk., \*Jørgen Bech.

**Amerikansk/Sibirisk Tundrahøjle** *Pluvialis dominica/fulva* (0,5,1)

1987: 9.8. Stignæs (S), ad. i sdr. trk., Morten Møller Hansen.

1997: 31.8. Ølsømagle Revle (S), ad. i odr. trk., \*Morten Jørgensen.

Fuglen ved Ølsømagle Revle i 1997 blev tagtaget kun få dage før opdagelsen af den Amerikanske Tundrahøjle på den samme lokalitet. Ifølge beskrivelserne er der imidlertid ikke tale om den samme fugl.

**Sumpvibe** *Chettusia leucura* (0.0,1)

1997: 13-14.7. Tissø (S), ad., \*Jytte Petersen, \*Morten Ellis Petersen m.fl. (F). – 15.7-10.8. Borreby Mose (S), ad., \*Jan Rasmussen, Michael Bladt, Stefan Stittrup m.fl. (F).

Ny art for landet. De to forekomster drejer sig givetvis om samme individ og er kun regnet som ét fund i opsummeringen. I 1997 blev arten tillige bemærket flere andre steder i Europa; blandt andet blev formentlig det samme individ set på fire forskellige lokaliteter i Sverige inden for perioden 22.6-14.7. Derudover sås arten i Finland (maj), Polen (maj) og Ungarn (september), samt i Grækenland, hvor der var flere fund mellem april og september: heriblandt et fund af en flok på fire individer i juli (Ganittet Europa). I 1975 optrådte arten tilsvarende invasionsagtigt i Europa (Alstrøm et al. 1991).

Den danske forekomst er sammen med de øvrige europæiske fund nærmere beskrevet af Ortvad (1997).

**Hvidryget Ryle** *Calidris fuscicollis* (0.9,1)

1997: 27-30.5. Ulfsale, Møn (M), ad. i sdr., \*Bo Netterstrøm, Niels Peter Andreasen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (F).

Arten er tidligere truffet to gange på Møn, begge gange ved Ulfsale i 1978; henholdsvis 17.7 (landets første) og 26.10 (Hansen 1978, Pedersen 1980). De øvrige danske fund er fordelt med 3 på Sjælland (1982, 1986, 1993) og 4 i Ringkøbing Amt (1984, 1985, 1990-2). Den månedlige fordeling er maj 2, juni 1, juli 4, august 1, september 1 og oktober 1.

**Stribet Ryle** *Calidris melanotos* (0.23,3)

1997: 2.6. Grønningen, Fanø (RB), \*Kim Fischer. – 16-19.7. Koføeds Enge, Amager (S), ad. δ, \*Preben Berg m.fl. – 10-21.8. Ulfsale, Møn (M), ad. ♀ i sdr., \*Jan Eske Schmidt, \*Andreas Bruun Kristensen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. Fundet fra Ulfsale er det første fra Møn.

**Prærieløber** *Tryngites subruficollis* (1,13,1)

1995: 19.9. Bøtø Nor (LF), \*Thomas W. Johansen, \*Gert Green.

1997: 14.8. Borreby Mose (S), \*Jan Fischer Rasmussen.

**Langnæbbet/Kortnæbbet Sneppeklire** *Limnodromus scolopaceus/griseus* (0.6,0)

1995: 7.9. Blåvandshuk (RB), trk., \*Rasmus Strack.

1996: 23.8. Blåvandshuk (RB), ad. i sdr. trk., \*Henrik Knudsen.

**Stor Kobbersneppe** *Limosa limosa*

Med karakterer svarende til Islandsk Stor Kobbersneppe ssp. *islandica* (0.1,2):

1997: 7.5. Tovsig, Tømmerby Fjord (NJ), ad. δ i sdr., \*Kent Olsen, \*Palle A. E. Rasmussen, Thomas Varto Nielsen. – 20.8. Kammerhusen (RB), ad. δ i sdr., \*Ole Thorup m.fl. Det første danske fund af denne race er fra 1995 og er kommenteret i Rasmussen (1997).

**Damklire** *Tringa stagnatilis* (0.37,5)

1990: 26.5. Havnø, Mariager Fjord (NJ), ad. i sdr., \*Calle Ljungbjerg m.fl.

1997: 15.4. Sønderland, Rømø (SJ), ad. i sdr., \*Morten Benzon Hansen, Søren Nygaard. – 28.4. Ilbro Enge, Tårs (NJ), ad. i sdr., \*Lars H. Mortensen. – 2.8. Hov Vig, Rørvig (S), \*Erik Vikkelso Rasmussen m.fl. – 28.8. Hov Vig, Rørvig (S), 1K, \*Svend Aage Linderstrøm. – 29.9. Margrethe Kog (SJ), \*Hans Harrestrup Andersen, \*Mariusz Ostanski, \*Niels E. Vedel.

Fundene fra Rømø og Margrethe Kog i 1997 er de første fra Sønderjylland. Iagttagelsen fra Rømø er den hidtil tidligste herhjemme; den næsttidligste er fra Korvlen på Sjælland 19.4 1987 (Olsen 1988). Den månedlige fordeling af de danske fund er: april 7, maj 12, juni 6, juli 5, august 9, september 2 og oktober 1.

**Gulbenet Klire** *Tringa flavipes* (1.1,1)

1997: 4-6.6. Læsø, Vejlerne (NJ), \*Thomas Varto Nielsen, Kent Olsen, Palle A. E. Rasmussen m.fl. (F).

Blot tredje danske forekomst; de to tidligere er fra henholdsvis efteråret 1912 ved Sønderborg i Sønderjylland (Salomonsen 1963) og 23.7 1982 ved Kalløgh på Lolland (Boertmann et al. 1986). Bemærk: at et fund fra Skallingen i Ribe Amt 28.5 1987 efter genbehandling ikke længere anerkendes (Frich & Nordbjerg 1995).

**Bonapartenåge** *Larus philadelphia* (0.2,0)

1996: 7-8.3. Hirtshals, Havn (NJ), 3K i odr., \*Anders Østerby, Kurt Prentow m.fl.

Fundet vedrører det samme individ, som tidligere er godkendt fra samme lokalitet 7.11-3.12 1995 (Rasmussen 1997).

**Hvidskægget Terne** *Chlidonias hybridus* (0.13,0)

1992: 22-25.5. Bygholm Vejle (NJ), 4 ad., hvoraf de to udgjorde et par, som forsøgte at yngle, \*Henrik Haaning Nielsen, \*Palle A. E. Rasmussen m.fl. (F).

1996: 22.10. Harboør Tange (RK), 1K, \*Palle A. F. Rasmussen.

Forekomsten fra 1992 er tidligere godkendt (Frich & Nordbjerg 1994), men først nu som yngleforsøg, i øvrigt det første herhjemme. Til trods for det korte ophold nære parret at bygge rede og parre sig, hvilket afgjort bør betragtes som et yngleforsøg. De øvrige to fugle udgjorde givetvis også et par, men yngleadfærd iagttoges ikke.



Høgeugle 2K, Bogø 18. januar 1997.  
Foto: Michael Baydorn.

De fire fugle sås flere gange sammen, og forekomsten er derfor kun regnet som ét fund.

Fundet fra oktober 1996 er landets tredje fra det seneste efterår: de to tidligere er begge fra Vejlerne i Nordjylland, henholdsvis 10-20.10 og 30.10 1987 (Olsen 1988) samt 25.10-6.11 1988 (Olsen 1989).

**Hvidvinget Terne** *Chlidonias leucopterus*

(3.54,4 ud over invasionen i 1997)

1979: 23.5-4.6 og 11.6. Bygholm Vejle (NJ), par i yngleforsøg, via Helge Røjlø Christensen.

1996: 6.8. Sønderbo, Fanø (RB), 1K, \*Kim Fischer.

1997: 20.8. Ølsemagle Revle (S), 1K trk., \*Tim Andersen. – 22.8. Lønnerup Fjord (NJ) og 25-30.8. Bygholm Vejle (NJ), ad. i odr., \*Thomas Varto Nielsen m.fl. – 28.8. Stensnæs (NJ), 1K trk., \*Palle A. E. Rasmussen. – 30.8. Mandehoved, Stevns Klint (S), 1K trk., \*Tim Andersen, Jan Fischer Rasmussen.

Fundet fra 1979 er tidligere godkendt (Pedersen 1982), men først nu som yngleforsøg. Parret opholdt sig i en koloni af Sortterne *Chlidonias niger*, hvor de parrede sig og ivrigt hævdede territorium. Yngleforsøget blev imidlertid opgivet efter at kolonien var blevet præderet af en Trane *Grus grus*, og 11.6 sås kun hannen. Yngleforsøget bliver således det første herhjemme.

Ud over de fire godkendte fund fra august 1997 har SU godkendt invasionen i maj 1997 og yngleforsøgene i forbindelse med invasionen en bloc, og fund fra perioden 10.5-1.8 skal således ikke forelægges SU. Invasionen i Danmark og i de omkringliggende lande er omlidt nærmere af Thorup et al. (1997), og yngleforsøgene herhjemme i forbindelse med invasionen er beskrevet af Grell & Rasmussen (1997).

**Slørugle** *Tyto alba*

Med karakterer svarende til nominatformen ssp. *alba* (0.3 ud over invasionen i 1990/91,2):

1997: 27.3. Hasselhol, Vinderup (RK), ♀, fundet det trafikdræbt, \*Terje Seidenfaden, \*Dennis Nielsen (F). – juli. Sønderjylland (SJ), δ, \*Bjarne Nielsen, \*Klaus Dichmann.

Fuglen fra Sønderjylland yngtede sammen med en ♀ af ssp. *guttata*, og parret fik udruget 4 unger. Kuldet blev imidlertid præderet af en husmår inden det blev flyvedygtigt. Det er første gang nominatformen er konstateret yngtende herhjemme.

**Sneugle** *Nyctea scandiaca* (-,27,3)

1997: 5.1. Røsnæs (S), 2K δ, \*Torben Sebro. – 25.1. Avedøre Holme (S), inm. eller ad. ♀ trk., \*Morten Jørgensen, \*Michael Fink Jørgensen, \*Poul Jørgensen. – 13.3-10.4. Dalmose, Skælskør (S), 2K δ, Ivan Olsen, Søren Nygaard m.fl. (F). De tre fund gør 1997 til det tredjebedste år for arten herhjemme i SU-perioden; de to største forekomster er fra 1990 med 7 fund 29.1-18.4. samt fra vinteren 1986/87 med 4 fund i perioden 22.12 1986-29.3 1987. Med de tre tagtælsel fra 1997 er der nu 9 fund på Sjælland i SU-perioden. De øvrige fund siden 1965 er fordelt med 18 i Jylland, heraf 13 ved Skagen, samt et enkelt på Bornholm.

**Høgeugle** *Surnia ulula*

(ca 30,32 ud over invasionen i 1983/84,0)

1996: 30.11-24.2 1997, Bogø (M), 2K, Klaus Malling Olsen m.fl. (F).

**Ellekrage** *Coracias garrulus* (-,20,1)

1997: 18-25.5. Østsmø (M), \*Vagn Valentinsen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (F).

Et fund fra 1982, som er nævnt i tidligere SU-rapport (Rasmussen 1997), er ikke som angivet det første fra Sønderjylland, men dog det første SU-godkendte fund herfra, idet et fund fra maj-juni 1971 ikke har været forelagt SU og heller ikke er omtalt af Rasmussen (1977).

**Korttået Lærke** *Calandrella brachydactyla* (0,22.3)  
1995: 11.6. Grønningen, Fanø (RB), \*Kim Fischer, Carsten K. Pedersen.

1996: 29.4. Sønderho, Fanø (RB), \*Kim Fischer.

1997: 6.10. Sønderho, Fanø (RB), \*Kim Fischer. – 26.10. Blåvandshuk (RB), trk., \*Henrik Haaning Nielsen, \*Søren Haaning Nielsen, \*Jan Rasmussen. – 15.11. Langli, Ho Bugt (RB), \*Jens Christian Friis Nielsen, \*Max Ejvind Nitschke. Fjerde år i træk med fund af denne art herhjemme. De ovennævnte forekomster er de første fra Sydvestjylland.

#### Rødrygget Svale *Hirundo daurica* (0,34.7)

1997: 15.5. Grenen, Skagen (NJ), trk.fors., \*Lars Raunsgaard m.fl. – 17.5. Grenen, Skagen (NJ), 2 eks. trk.fors., \*Troels Eske Ortvad, \*Lennart Pedersen m.fl. – 22.5. Batterivej, Skagen (NJ), trk.fors., \*Gunner Pedersen, \*Finn Enemark, \*Peter Arp-Povlsen. – 24.5. Bygholm Vejle (NJ), \*Palle A. F. Rasmussen, Helge Røjle Christensen m.fl. – 25.5. Hanvejle (NJ), \*Henrik Haaning Nielsen, \*Palle A. F. Rasmussen, \*Kent Olsen m.fl. – 28.5. Hanvejle (NJ), 2 eks., \*Kent Olsen, \*Palle A. F. Rasmussen m.fl. – 8.6. Vesløs Vejle (NJ), \*Ole Goldschmidt, Susanne Bruun, Helge Røjle Christensen.

Selv om flere af de ovennævnte fund kunne vedrøre de samme individer, har SU af forskellige årsager valgt at betragte alle årets forekomster som særskilte fund. Dermed er 1997 med 7 fund af 9 individer det hidtil bedste år for arten herhjemme, andre gode år har været 1988 med 6 fund og 1996 med 3 fund. Indtagelserne fra Skagen 17.5 og Hanvejle 28.5 er de første herhjemme med mere end et individ involveret. I øvrigt er det overraskende, at arten ikke blev iagttaget andre steder end i Nordjylland i 1997.

#### Bjergpiber *Anthus spinoletta* (0,21.8)

1995: 21.3. Tøndermarsken (SJ), sdr., \*Lars Maltha Rasmussen, sdr. (F). – 20.22.12. Sønderho, Fanø (RB), vdr., \*Kim Fischer.

1996: 19.11-11.4.1997. Bygholm Vejle (NJ), min. 6 eks. i vdr., hvoraf 2 eks. senere sås i sdr., \*Palle A. F. Rasmussen, \*Thomas Varto Nielsen, \*Henrik Haaning Nielsen m.fl. – 20.12-21.3.1997, Arup Vejle (NJ), min. 2 eks. i vdr., \*Palle A. F. Rasmussen, \*Thomas Varto Nielsen. – 6.12. Årup Dambrug, Thy (NJ), 2 eks. i vdr., \*Henrik Haaning Nielsen, \*Thomas Varto Nielsen.

1997: 16-17.1. Gilleleje (S), vdr., \*Jan Hjort Christensen m.fl. – 28.1. Aggersborg Vildtreservat (NJ), 2 eks. i vdr., \*Thomas Varto Nielsen. – 15.2. Kynbyh Vig (S), vdr., \*Edith Nielsen, \*Jan Haaning Nielsen. – 29-30.3. Strøby Enge, Stevns (S), 1 eks. i vdr. og 3-4 eks. i sdr., \*Tim Andersen,

\*Anita Petersen, \*Thomas W. Johansen. – 20.11-16.12. Buttervej og Nedermose, Skagen (NJ), min. 20 eks. i vdr., \*Henrik Haaning Nielsen, \*Dennis Nielsen, \*Thomas Varto Nielsen, Rolf Christensen m.fl. – 25.11. Tipperne (RK), vdr., \*Henrik Knudsen. – 25.11 og 5.12. Stensnæs (NJ), 2 eks. i vdr., \*Palle A. F. Rasmussen. – 27.12-1.1.1998. Elling Å's udløb, Frederikshavn (NJ), vdr., \*Erik Holm Sørensen.

Arten er udgået af SU-listen fra og med 1998. Det synes nu, især på baggrund af forekomsterne de seneste vintre, at være vel dokumenteret at arten forekommer som en regelmæssig vintergæst mellem oktober-november og april, i et antal som ikke berettiger artens tilstedeværelse på SU-listen. Arten ses stadig flere steder herhjemme, men de fleste fund og de største antal er fra Nordjylland, hvor Vejlerne, Skagenområdet og Gravlev Ådal synes at være faste overvintringssteder. Et samlet overblik over artens optræden herhjemme fås ved at sammenholde nærværende rapport med Rasmussen (1997), hvor der også findes yderligere kommentarer.

Bemærk, at opsummeringen var ukorrekt i tidligere SU-rapport (Rasmussen 1997), hvor den skulle have været (0,4.7.5).

#### Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Med karakterer svarende til Sorthovedet Gul Vipstjert ssp. *fellegg* (0,3.1):

1997: 12-13.5. Lund Fjord (NJ), ♀, \*Kent Olsen, \*Palle A. F. Rasmussen.

Det første fund herhjemme siden 1992, og det første af en ♀. Alle fire danske fund er fra Nordjylland, og det aktuelle er det tredje fra Vejlerne.

#### Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0,10.1)

1997: 25-26.9. Højrup, Stevns Klint (S), IK, \*Tim Andersen, \*Jørgen Hulbæk Christiansen, Jan Pedersen m.fl.

#### Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* (2,50.1)

1996: 22.5-22.6. Ishøj Strand (S), syng. og iagttaget, \*Robert Trojaborg, Ivan Olsen m.fl. (B).

1997: 24.5. Fællesskoven, Stevns (S), \*Svend Aage Linderstrøm.

Et fund fra maj 1984 på Christiansø (Boertmann et al. 1986) anerkendes efter genbehandling ikke længere. Opsummeringen er derfor ændret.

#### Blåhals *Luscinia svecica*

Med karakterer svarende til Sydlig Blåhals ssp. *cyaneula* (-23.0):

1996: 22-24.4. Sønderho, Fanø (RB), ♂, syng., \*Kim Fischer.

Vær opmærksom på at fund af Sydlig Blåhals stadig skal forelægges SU, hvilket også gælder for yngleområderne i Sønderjylland.

Foto: Jens Jørgen Andersen.



Blåstjert IK, Hansholm 28. september 1997.

#### Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (0,4.1)

1997: 28.9. Hansholm Fyr (NJ), IK ringm., \*Jens Jørgen Andersen, Leo Salmonsén, John Kristensen Kyed m.fl. (F).

Andet år i træk med fund af denne art herhjemme.

#### Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Med karakterer svarende til Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl ssp. *maurastejnegeri* (0,27.0):

1996: 23.4. Sønderho, Fanø (RB), 2K+♂, \*Kim Fischer.

#### Ørkenstenpikker *Oenanthe hispanica* (0,3.1)

1995: 23-26.11. Sønderho, Fanø (RB), ♀, \*Kim Fischer m.fl. (F).

1997: 16-29.3. Nordenhuse, Nyborg (F), 2K ♂, \*Bo K. Stephensen, Tim H. Hansen m.fl. (F).

Fundet fra 1995 er tidligere godkendt, men kun fra 25.11 (Rasmussen 1997). Fuglen fra marts 1997 havde karakterer svarende til den østlige form ssp. *melanoleuca*. De to øvrige danske fund er begge fra efteråret 1987 (Olsen 1988).

#### Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* (0,3.1)

1997: 15.5. Batterivej, Skagen (NJ), ad. ♂, \*Morten Christensen, Erik Christophersen, Knud Pedersen m.fl. (F).

De tidligere danske fund er fra Skagen 13.6.1991 samt Christiansø 27.10-7.11.1991 og 7.10.1992 (Frich & Nordbjærg 1993, Rasmussen 1997).

#### Rødstrubet/Sortstrubet Drossel *Turdus ruficollis*

Med karakterer svarende til Sortstrubet Drossel ssp. *arrogularis* (2,4.0):

1993: 10.10. Sønderho, Fanø (RB), IK ♂, \*Kim Fischer.

De øvrige danske fund er fra 1822, 1872, 1983, 1986 og 1991, og alle er fra november-december, bortset fra landets første, som er et udateret efterårsfund.

#### Vindrossel *Turdus iliacus*

Med karakterer svarende til Islandsk Vindrossel ssp. *coburni* (0,2.0):

1995: 24.10. Blåvandshuk (RB), ad. ringm., \*Rasmus Strack m.fl. (F). – 1.11. Blåvandshuk (RB), IK ringm., \*Rasmus Strack m.fl.

De første godkendte fund herhjemme af denne race, der yngler på Island og Færøerne. Den overvintrer almindeligt på de Britiske Øer samt i Frankrig og på den Iberiske Halvø. Racen kan være overset herhjemme, idet den kun med sikkerhed kan bestemmes i hånden.

#### Flodsanger *Locustella fluvialis* (3,88.-)

1985: 11.5. Hanvejle (NJ), syng., \*Palle A. F. Rasmussen, John Pedersen.

Fund efter 1988 skal ikke forelægges SU.

#### Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum* (0,22.3)

1997: 5-28.6. Christiansø (B), ringm. (5.6) og syng., \*Jacob Sterup Andersen, Michael Johansen (F). – 6.6., Christiansø (B), syng. og iagttaget, \*Jacob Sterup Andersen, Michael Johansen, Mogens Henriksen. – 4-8.7. Køge Sydstrand (S), syng. og iagttaget, \*Tim Andersen m.fl. (F+B).

#### Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* (0,29.2)

1996: 24.4. Sønderho, Fanø (RB), ♂, \*Kim Fischer.

1997: 28.4. Langli, Ho Bugt (RB), 2K ♂ ringm., \*Jens Hjernild Hansen (F). – 20-22.5. Blåvandshuk (RB), ♂, syng., \*Søren Haaning Nielsen, Henrik Knudsen, Bent Jacobsen m.fl. (F+B).

#### Sorthovedet Sanger *Sylvia melanocephala* (0,22.2)

1997: 4.5. Sønderland, Rømø (SJ), ♀, \*Ole Thorup. – 22.5. Batteriskoven, Skagen (NJ), 2K ♂, \*Rolf Christensen, Erik Christophersen m.fl. (F).

De to tidligere danske forekomster er fra henholdsvis Christiansø 1.6.1978 (Pedersen 1980) og Hvide Sande i Ringkøbing Amt 23.5.1982 (Boertmann et al. 1986). Begge fund vedrører hanner, som blev ringmærket. Det første drejer sig ifølge beskrivelsen i Pihl & Rabøl (1979) om en 2K ♂, hvilket ikke fremgår af Pedersen (1980).

#### Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus* (0,28.1)

1997: 18.10. Klarskov, Vestsjælland (S), \*Jørgen Bech.

### Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* (0,13,0)

1995; 25.8. Sønderho, Fanø (RB), ad. \*Kim Fischer.

Som omtalt i den forrige SU-rapport (Rasmussen 1997) betragtes den vestlige race *bonelli* og den østlige race *orientalis* af bjergløvsanger nu som to selvstændige arter, henholdsvis Vestlig Bjergløvsanger og Østlig Bjergløvsanger *Phylloscopus orientalis*. Imidlertid er ikke alle tidligere danske fund racebestemt, og indtil de er genbeholdt efter de nyeste bestemmelser kriterier omhandler opsummering derfor alle fund af bjergløvsanger herhjemme. Som det ser ud lige nu er imidlertid kun Vestlig Bjergløvsanger truffet i Danmark. Bemærk endvidere at SU også fremover behandler fund af bjergløvsangere, som ikke artsbestemmes.

### Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* (18,145,5)

1996; 19.5. Nordby, Fanø (RB), ♂, \*Kim Fischer.  
1997: 5.5. Christiansø (B), ad. ♂ ringm., \*Jacob Sterup Andersen, \*Michael Johansen (F). – 5.5. Christiansø (B), 2K ♂ ringm., \*Jacob Sterup Andersen, \*Michael Johansen. – 10.5. Saltholm (S), ad. ♂, \*Torben Sebro, \*Niels Linnet. – 11.5. Kongelunden, Amager (S), ad. ♂, \*Lars Thorhauge Rask m.fl. – 11.5. Christiansø (B), 2K+ ♀ ringm., \*Jacob Sterup Andersen, \*Michael Johansen (F). Arten er udgået af SU-listen fra og med 1998. Se i øvrigt kommentarer i Rasmussen (1996, 1997).

### Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* (3,35,2)

1997: 25.5. Magleby og Ny Borre, Møn (M), ad. ♂, \*Tim Andersen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (F). – 4.6. Flyndersø, Rørvig (S), antagelig ad. ♂, \*Hemming Vikkelsø Rasmussen m.fl.  
Tredje år i træk med fund herhjemme.

### Sydlig Stor Tornskade *Lanius meridionalis* (0,2,1)

Med karakterer svarende til Steppetornskade ssp. *palladii* strits:  
1997: 19.26.11, Buttervej, Skagen (NJ), 1K, \*John Pedersen, Knud Pedersen, Rolf Christensen m.fl. (F).  
Tredje danske fund: de to første er begge fra 1996, se Rasmussen (1997).

### Sibirisk Alike *Corvus dauricus* (0,0,1)

1997: 12.4. Blåvandshuk (RB), ad. rk., \*Per Kjær, \*Søren Haaning Nielsen, \*Lasse Strandgaard. Ny art for landet. Denne sibiriske art er før 1997 kun truffet ganske få gange i Europa, i april-juni: Finland (1883), Sverige (1985), Holland (1995) og Frankrig (1995). Det svenske fund er omtalt af Olsson (1988) og det hollandske af Meijer (1996). I 1997 sås antagelig i Holland, hvor det samme individ blev set trække mod nord på tre forskellige

lokaliteter langs kysten i perioden 8-11.5 (Gantlett 1998). Denne fugl kunne være identisk med den danske. Det er også tænkeligt, at fundene fra maj 1995 i Holland og juni 1995 i Frankrig vedrører samme fugl.

### Rosenstær *Sturnus roseus* (18,34,1)

1995: 13.9-5.10. Nordby, Fanø (RB), 1K, \*Kim Fischer, Steen Brølling m.fl. (F).

1997: 6-15.6. Selbjerg Vejle, Bygholm Vejle og Kærup Holme (NJ), 2K+, \*Kent Olsen, Thomas Varto Nielsen, Palle A. F. Rasmussen, Henrik Haaning Nielsen m.fl.

### Ørkendompap *Bucanetes githagineus* (0,1,1)

1997: 2.6. Allandshage, Amager (S), hunfarvel, \*Preben Berg, Vagn Valentinussen (F).

Det andet danske fund: det første er fra Christiansø, hvor en han sås i perioden 22.6-3.7 1982 (Boertmann et al. 1986). Fra Nordvesteuropa foreligger der kun yderligere 10 fund, hvoraf hovedparten tidsmæssigt falder pænt sammen med de to danske forekomster: Sverige 2 (juni), Tyskland 1 (juli) samt de Britiske Øer 7 (maj-juni 5, august-september 2).

### Krøgnæb *Pinicola enucleator* (-,16-23,1)

1997: 5.10. Skagen Nordby (NJ), ad. ♂, \*Knud Erik Christensen.

Det hidtil tidligste fund herhjemme i SU-perioden; de næsttidligste er fra henholdsvis 12.10 1975 ved Skagen i Nordjylland (Pedersen 1980) og 12.10 1991 ved Solrød Strand på Sjælland (Frich & Nordbjærg 1993). De øvrige danske fund siden 1965 er alle fra perioden 2.11-14.3.

### Hvidkindet Værting *Emberiza leucoccephalos* (0,1,1)

1997: 18-19.10. Christiansø (B), ♂, \*Rasmus Turin, Jacob Sterup Andersen m.fl.

Andet danske fund; det første er fra 1973, hvor en han sås ved Skjern i Ringkøbing Amt (Pedersen 1980). Arten optræder tilsyneladende stadigt hyppigere vest for udbredelsesområdet i den centrale og østlige del af Asien, fra Ural mod øst til Sakhalin, og der foreligger nu adskillige fund fra en lang række lande i Europa, de fleste fra efterårs- og vintermånederne, se f.eks. Alström et al. (1991) og Snow & Perrins (1998). Ret overraskende overvintrer arten tilsyneladende regelmæssigt i Italien, hvor der blandt andet i vinteren 1995/96 sås en flok på 40-50 individer, hvoraf 13 blev ringmærket (Corso 1996).

Ved bestemmelse af Hvidkindet Værting bør man være opmærksom på, at hybridisering med Gulspry *Emberiza citrinella* er ret udbredt i den vestlige del af udbredelsesområdet, og hybrider mellem de to arter er flere gange truffet i Europa.

### Pileværting *Emberiza rustica* (0,36,0)

1996: 22.9. Sønderho, Fanø (RB), hunfarvel, \*Kim Fischer.

### Gåsegrüb *Gyps fulvus* (0,0,1)

1988: 8.5. Husby Sø (RK), \*Christian Hjort m.fl. – 11.5. Esbjerg Havn (RB), trk., via Rolf Christensen. – 13-18.5. Fanø (RB), via Rolf Christensen.

I alle tre tilfælde drejer det sig om samme individ, som ca. tre uger tidligere var undsluppet fra en røvlegtepark i Bayern i Sydty-skland. Fuglen blev efter nogle dages ophold på Fanø indfanget og henlet tilbage til fangenskab.

Det er det første fund af arten herhjemme, hvor der med sikkerhed har været tale om en undsluppet fangenskab-fugl. De tre øvrige fund fra henholdsvis foråret 1858, maj 1985 og oktober 1986 betragtes alle som spontane (Olsen 1992). Fundet fra 1988 er tidligere omtalt af Olsen (1992), men er først nu behandlet og godkendt af SU.

## Grønland

### Stor Regnspeve *Nimemus arqata*

1997: 7.7. Zackenberg, A.P. Olsen Land, Nord-østgrønland. \*Hans Meltofte.  
Det femte grønlandske fund; et fund fra 1980 var i øvrigt fra samme område (Boertmann 1994).

### Bysvale *Delichon urbica*

1997: 3.7. Traill Ø, Nordøstgrønland. \*Antti Below, \*Paavo Hellstedt.  
Der er kun tre tidligere grønlandske fund: det seneste er fra foråret 1989 (Boertmann 1994).

### Endnu ikke færdigbehandlede sager

*Records still under consideration by the committee*

Dvergørn *Hieracetus pennatus* 1992: 7.6. Nymindesb (RB), mørk fase.

Lannerfalk *Falco biarmicus* 1993: 28.8. Sønderho, Fanø (RB), ad. ♂.

Lille Tårnfalk *Falco naumanni* 1995: 19.8. Grønningen, Fanø (RB), 2K ♂.

Jomfrutane *Anthraxis virgo* 1973: Toftum, Rømo (SJ), Rødhalsed Ryle *Calidris ruficollis* 1997: 8.6. Agger Tan-ge (NJ), ad. i sdr.

Ringnebhet Måge *Larus delawarensis* 1997: 2.10. Grønningen, Hvidbjerg Strand (RB), 1K.

Stor Sorthovedet Måge *Larus ichthyaetus* 1986: 6.8. Grønningen, Fanø (RB), 3K (F). – 1994: 1.11. Esbjerg Havn (RB), 2K.

Bonaportmåge *Larus philadelphia* 1989: 27.3. Esbjerg Havn (RB), 2K.

Klippevale *Pycnonotus rupestris* 1997: 13.6. Islands Brygge, København (S).

Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata mau-ralis* 1994: 19-26.3. Blåvandshuk (RB), ♂ (F).

Sibirisk Gærdesanger *Sylvia curruca blythi* 1984: 16.10. Blåvandshuk (RB), ringm. (F).

Ørkengærdesanger *Sylvia curruca minula* 1992: 20.10, Blåvandshuk (RB), 1 K ringm. (F).  
 Humes Sanger *Phylloscopus humei mandellii* 1990: 22.10.5.11, Christiansø (B) ringm. (F).  
 Iberisk Sanger *Phylloscopus brehmii* 1997: 31.5-5.7. Fællesskoven, Stevns (S), syng. og tagttaget (B).  
 Svammige Bakker, Faaborg (F), syng. og tagttaget (B).  
 Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* 1996: 25.27.5. Stenholt Indelukke, Grih Skov (S), 2 K, 2 syng. Steppetornskade *Lanius meridionalis pallidioris* 1997: 19.10. Præsto Fed (S).

## Forkastede sager

### Records not accepted

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* 1996: 31.8. Sønderhø, Fanø (RB), 2 eks. tk. – 1997: 11.4. Korshage, Rørvig (S), tk. 19.9. Gilleleje (S), 2 eks. 21.9. Hundested Fyr (S), 21.9. Ørbøge (NJ).  
 Lille Skråpe *Puffinus assimilis* 1997: 4.10. Blåvandshuk (RB), tk.  
 Fregatfugl *Fregata* sp. 1994: 18.9. Ørbøge (NJ), tk.  
 Purpurhejre *Andea purpurea* 1997: 7.6. Vesløs Vejle (NJ), imm. 14.6. Ulvedybet (NJ).  
 Amerikansk Pibesvane *Cygnus columbianus columbianus* 1994: 10.12. Ulvedybet (NJ), ad. – 1997: 22.2. Østereng, Skovby (ÅH).  
 Dvergæg *Anser erythropus* 1994: 20.4. Sønderhø, Fanø (RB), tk.  
 Rodhalset Gås *Branta ruficollis* 1993: 29.9. Sønderhø, Fanø (RB), tk.  
 Sortbrun And *Anas rubripes* 1988: 26.10. Hammern (B), tk.  
 Amerikansk Sortand *Melanitta nigra americana* 1996: 3.12. Sønderhø, Fanø (RB), 2 eks.  
 Slangeørn *Circus gallicus* 1997: 14.5. Mørn, Sydsjælland (S), tk.  
 Steppehøg *Circus macrourus* 1997: 6.6. Fakkebjerghøj, Langeland (F), 3 K + 2 tk.  
 Ormevåge *Buteo rufinus* 1997: 8.5. Slettestrand (NJ), tk.  
 Lille Skrigørn *Aquila pomarina* 1997: 9.5. Rødovre (S), tk.  
 Stor Skrigørn *Aquila clanga* 1997: 19.9. Kolding (VE), tk.  
 Dvergørn *Hieraetus pennatus* 1997: 16.5. Ølene (B), mørk fase tk.  
 Eleonorafalk *Falco eleonorae* 1997: 12.6. Nørrevang, Rørvig (S), tk.  
 Slagfalk *Falco cherrug* 1981: 23.2-14.3. Sønderhø, Fanø (RB), 2 K. – 1995: 25.26.5. Skagen (NJ), tk. fors. – 1996: 1.10. Margrethe Krog (S), ad. 2.10. Ballum Fortland (SJ), ad. 2.6-10.10. Sønderhø, Fanø (RB), ad. 2 eks.  
 Jagtfalk *Falco rusticolus* 1993: 17-18.9. Sønderhø, Fanø (RB), tk. – 1997: 18.9. Sønderbjerg, Anholt (ÅH).  
 Stribet Ryle *Calidris melanotos* 1993: 14.8. Borreby Mose (S).  
 Islandske Stor Kobbersnepe *Limosa limosa islandica* 1997: 2.8. Bygholm Vejle (NJ), ad. i sdr.  
 Sildemåge *Larus fuscus hargitini* 1994: 1.11 og 22.11. Esbjerg Havn (RB), ad.

Rosenterne *Sterna dougallii* 1997: 24.7. Sønderhø, Fanø (RB), ad. i sdr. tk.  
 Rødrygget Svale *Hirundo daurica* 1997: 17.5. Gilbjerg Hoved (S), tk.  
 Citronvipstert *Motacilla citreola* 1995: 20.9. Gedsø Odde (LF), ad. 2 i sdr.  
 Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* 1984: 16.5. Christiansø (B), syng. (B). – 1997: 8.5. Anholt (ÅH), ringm. 22.5. Aflandshage, Amager (S), syng.  
 Gærdesanger *Sylvia curruca* 1990: 17.3. Skovlunde (S), syng. og tagttaget.  
 Schwarz Lav-sanger *Phylloscopus schwarzi* 1997: 9.10. Hørsholm (NJ).  
 Lundsanger *Phylloscopus trochiloides* 1990: 20.5. Jydelejet, Møn (M), syng. og tagttaget.  
 Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* 1981: ultimo maj. Råmosen, Ballerup (S), ad. 2. – 1997: 28.5. Anholt (ÅH), 2 eks.  
 Korttået Træløber *Certhia brachydactyla* 1997: 8.5. Vandet Sø (NJ), ringm. (F).  
 Steppetornskade *Lanius meridionalis pallidioris* 1997: 7.12. Borreby Mose, Møn (M).  
 Indisk Huskrage *Corvus splendens* 1996: 10.9. Horsens (VE).  
 Krognæb *Picicola enucleator* 1990: 7.4. Gilleleje (S), hufarvet tk.  
 Dvergæg *Anser erythropus* 1989: 11.9. Sønderhø, Fanø (RB), tk.  
 Gulbrystet Værting *Emberiza aureola* 1997: 6.6. Bramming (RB), 2 eks.

## Summary

### Rare birds in Denmark and Greenland in 1997

In 1997 the Danish Rareities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 225 records of which about 80% were accepted.

The main section of the report, Accepted records, includes species on the Danish list belonging to category A, B, and C, according to the AERC standard: species belonging to category D and E are treated after the main section, before the sections dealing with records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted.

For each record the following details are included: 1) year and date, 2) locality (see map for regions), 3) number of individuals if more than one, 4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transition plumage, K = calendar year, fundet død = found dead, ringm. = ringed, and 5) name of observer(s), with finiders marked by asterisks. Where applicable, documentation by photo (F), video (V) or tape (B) is indicated.

The three numbers in brackets after the species name refer to, respectively, the total number of records (not individuals) in Denmark (1) before 1951, (2) from 1951 to 1996 incl., and (3) in 1997.

The present report adds two new species to the Danish list: White-tailed Lapwing *Chettusia leucura* and Daurian Jackdaw *Corvus dauricus*. A new subspecies was Ice-

landic Redwing *Turdus iliacus coburni* (from 1995). Other remarkable occurrences in 1997 were second records of Little Shearwater *Puffinus assimilis*, Lesser Scaup *Anas platyrhynchos*, Trumpeter Finch *Buccones githagineus*, and Pine Bunting *Emberiza leucocephala*, and an unprecedented invasion of White-winged Black Tern *Chlidonias leucophaea*, including several breeding attempts.

## Referencer

- Alström, P., P. Colston & I. Lewington 1991: A field guide to the rare birds of Britain and Europe. – Domino Books Ltd.  
 Boertmann, D., K.M. Olsen & B.P. Nielsen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.  
 Boertmann, D. 1994: An annotated checklist to the birds of Greenland. – Meddr Grønland. Biosci. 38.  
 Dybbro, T. 1978: Oversigt over Danmarks fugle. – DOF, København.  
 Clarke, L., J. Antonio Lorenzo Gutiérrez & J. King 1995: The Lesser Scaup on the Canary Islands: the first female for the Western Palearctic. – Birding World 8: 52-55.  
 Corso, Andrea 1996: The Pine Buntings in Italy. – Birding World 9: 14.  
 Evans, L.G.R. 1994: Rare birds in Britain 1800-1900. – LCR Publications Ltd., Buckinghamshire.  
 Evans, L.G.R. 1996: Lesser Scaups in Britain. – Birding World 9: 144-145.  
 Flamm, D. 1996: The Lesser Scaup in Cornwall – the first female for Britain. – Birding World 9: 431-432.  
 Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 231-241.  
 Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.  
 Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.  
 Gantlett, S. 1998: 1997, the Western Palearctic year. – Birding World 11: 21-37.  
 Grell, M. & L.M. Rasmussen 1997: Første ynglefund af Hvidvinget Terne *Chlidonias leucophaea* i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 121-124.  
 Hansen, E., Per Schiermæcher Hansen & Bent Pors Nielsen 1974: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1973. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 138-144.  
 Hansen, P. S. 1978: Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* på Ulvshale, Møn, den 17. juli 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 72: 221-224.  
 Hørring, R. 1942: Om 6 for Danmarks Fauna nye Fuglearter. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 36: 40-54.  
 Meijer, A.W.J. 1996: Daurische Kaud in Hollandse kuststreek in mei 1995. – Dutch Birding 18: 226-231.  
 Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.  
 Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-149.  
 Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle - en oversigt. – DOF, København.  
 Olsson, C. 1988: Klippkaja *Corvus dauricus* for første gang antræffad i Sverige. – Vår Fågelvärld 47: 197-199.  
 Ortvad, T.E. 1997: Sumpvibe på Sjælland. – DOF NYT 1997(4): 23.  
 Pedersen, B.B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.  
 Pedersen, B.B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.  
 Pedersen, B.B. 1984: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1981. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: 81-92.  
 Phil, S. & J. Rabøl 1979: Sørbøvedet Sanger *Sylvia melanocephala* - ny art for Danmark og Skandinavien. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 247-248.  
 Rasmussen, E.V. 1977: Danske forekomster af Hærfugl *Upupa epops* 1969-1975. Bieder *Merops apiaster* og Ellekrage *Coracias garrulus* 1970-1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 37-42.  
 Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.  
 Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.  
 Rogers, M.J. & the Rareities Committee 1995: Report on rare birds in Great Britain in 1994. – British Birds 88: 493-558.  
 Rogers, M.J. & the Rareities Committee 1996: Report on rare birds in Great Britain in 1995. – British Birds 89: 481-531.  
 Salomonsen, F. 1963: Oversigt over Danmarks Fugle. – Munksgaard, København.  
 Scott, M. 1995: The status and identification of Snow Goose and Ross's Goose. – Birding World 8: 56-63.  
 Snow, D.W. & C.M. Perrins 1998: The birds of the Western Palearctic. Concise edition. – Oxford University Press.  
 Thorup, K., J.J. Madsen & T. Ortvad 1997: Hvidvinget Terne blev årets begivenhed. – DOF NYT 1997(3): 3-4.  
**Rettelser til SU-rapport nr 26, DOFT 91: 133-150, 1997**  
 Amerikansk Krikand 1996: 16-17.4. Hjørlund Hede. Grindsted (RB) skal være ad. han.  
 Amerikansk Tundrahjelle 1996: 24.8. Neksø Sydsørand skal være 24-25.8.  
 Prærieløber 1996: 17-21.5. Bygholm Vejle (NJ), 2 eks., dog kun ét eks. 17.5 skal være 17.5 2 eks., heretter kun 1 eks. til og med 21.5.  
 Fuglekongesanger: Fundet fra 1989 ved Fyns Hoved var allerede godkendt og publiceret i SU-rapporten for 1989 (Olsen 1991). Opsummeringen ændres derfor til (0, ca 85-).  
 Gulrirk: Fuglen ved Skagen 30.11.1995 - 19.3.1996 var landets tredje og ikke andet vinterfund som omtalt, se Christensen & Søby (1998).  
 Anagat 22. august 1998  
 Palle A. F. Rasmussen  
 Svendsgade 6, 3. th  
 9000 Aalborg